

وزعمنا التربة الماخوزة ما منفتحة الماشدية (التي تمتاز بدرجة بلوغة والمهنة

Electric conductivity في عشرين سنة

وبعد ذلك أخذنا بذور نبات فول الصويا من نوع (Lee) ولونناها

بكتريا *Rhizobium japonicum* التي تكون المقعد الجذرية. وبكتريا

pseudomonas بواسطة الحامل الذي يكون في هذه البجربة هو البتوس

حيث من جنس البتور مع البتوس الحوي. والى ذلك من بكتريا *R. japonicum*

وتلك في خلقة من *pseudomonas* لغرض مقارنة المتكثر الأملح من بكتريا

pseudomonas الذي يعمل أحسن إنتاج من نبات فول الصويا

المتأثير السقطة في حالات

1) 2 ml *R. japonicum* + 0.5 ml *pseudomonas*

2) 2 ml *R. japonicum* + 1 ml *pseudomonas*

3) 2 ml *R. japonicum* + 1.5 ml *pseudomonas*

4) 2 ml *R. japonicum* + 2 ml *pseudomonas*

5) 2 ml *R. japonicum* (Control)

الأربعاء ١٩/٦/١٩٩٩

قمنا بزراعة بذور فول الصويا الملونة بتأثير خلقة من


بكتريا *pseudomonas* وهي 0.5 ml - 1 ml - 1.5 ml - 2 ml

ومضافة إلى 2 ml من *Rhizobium japonicum* وهذه البجربة

لقد لفتت الأنظار حيث أن مدة مزارعة السن قد أثرت على

البذر وعلى لفت البذر التي أمنت في هذه البجربة وفضلنا

المتأثير الحوي تلك البجربة والبذر في الفلك



- S.C.P -

المركبات البروتينية

Single Cell
protein

Q.C.C.

شیراز

میرزا

میرزا

تفحص الكائنات الدقيقة (مماثر وكتريا) على
العنبر الطبيعي لاستنتاج العلاقة الحسية

٥

محاولة تفحص الكائنات الدقيقة (مماثر وكتريا) على مصادر هابر وروكافورت
(عنا صبيح) المصدر للعربية ديلا من المصادر الاخرى وذلك لاستنتاج العلاقة
الحسية والتي تفقد المصدر بروين في كفتية الدواهن والمحترات

1. The first part of the paper is a

very short and simple one

8

2. The second part of the paper is a

very short and simple one

3. The third part of the paper is a

ستارج

١٩٩٨ / ٨ / ٢

(SA3)

اجرينا تجريباً لنتيجة *S. cerevisiae* على وسط زرني مبلور من

الاملاح فقط (g/l)

1- KH_2PO_4 5.0

2- $(NH_4)_2SO_4$ 3.0

3- $MgSO_4$ 5.5

4- KCl 0.1

5- $CaCl_2$ 0.1

6- $NaCl$ 5.0

7- Ethanol or 5 ml

Methanol

8- D.W. 1 liter pH = 5.5

علنا مقبولة مختبرية ووسط زرني (الت) وبعد ذلك لفتح الوسط
الزرني بـ ٤٪ حبيزة (بعد تنظيفه على الوسط الزرني الطاهر بالحبيزة).
وكانت نتائج نمو الحبيزة بعد ٢٤ ساعة
«OD» «OD»

Zero time 1.05

After 21 hr. 1.09

After 45 hr. 1.143

After 69 hr. 0.08

الوسط الزرني الذي تم تنمية العزلة عليه

yeast extract 4.5 1.125

pepton 7.5 1.875

glucose 10 2.5

Agar 20 5

gm / 1 liter gm / 250 ml

pH 6.5 - 6.6 P.W. P.W.

٢١٨١٠٠٠٠
٢- أعيدت التجربة بتاريخ ١٥/٩/١٩٨٨

وكانت النتائج: «حول مومي» ٥٥٥٠ ٥. D

نسبت العنارة بالمعيار على

درهم = ١.١٦٦ ٢٤ hr

نسبت هبوط و صعود نسبة ال

٥ D هو عدم كفاءة لوجر مرة لفرقة

للجوار أصح - أصبحت لنا الحجرة شبيهة

أخر - لتزيد السعة الزرقاء بالأكسجين ٢.٠٤ ١٢٠ hr

٣- الحديث التجربة بتاريخ ١٩/٩/١٩٨٨

وكانت النتائج:

«حول مومي» ٥٥٥٠ ٥. D Time

نسبت العنارة بالمعيار على

درهم = ١.٠٧٣ Zero time

١.٢٥٢ ٢٤ hr

١.٤٦٥ ٤٨ hr

١.٧٨٠ ٧٢ hr

٢.٢٤٢ ٩٦ hr

٢.٣٢٥ ١٠٠ hr

٤- تجربة بتاريخ ١٣/١٠/١٩٨٨

النتائج: «حول مومي» ٥٥٥٠ ٥. D Time

تغير ١.٥٠ من البداية

نسبت العنارة بالمعيار على

درهم = ١.٠٩ ٢٤ hr

١.٣٢ ٤٨ hr


١.٥٢ ٧٢ hr


١.٨٦ ٩٦ hr

تم قياس الـ pH وهدأته ٤.٩

وبعد ذلك أخذنا المستعمر والبالغ في ورمين وحقن في طاق

بإبريق ١٤٠٠ غم





٥- اختبار لدرجة سيارج ١٩٩٨/١٠/١٠

وحدات لستاج ٥٥٥ جول بروجي

Time	0.D
Zero time	0.619
24 hrs	1.098
48 hrs	1.282
72 hrs	1.507
96 hrs	1.83

تم قياس الـ pH وحيد آتة ٥.٢

تم ايقاف التجربة وقياس ما تبقى من الـ الرز في وحيد آتة ٤.٥٥

و تم ترسيب النموذج وجمعته وقياس وزنه وهد آتة الوزن الحاد

ميسرل ٥٩٩ - ٩١١/١١ - ٥٠٤٧

٦- تجربة سيارج ١٩٩٨/١٠/١١

وحدات لستاج

Time	0.D	٥٥٥ جول بروجي
Zero time	0.67	ثبت إقانة على إقتار
24 hrs	1.095	بالدم ٢٥
48 hrs	1.286	في رز في إقتار
72 hrs	1.578	١.٥ لتر
96 hrs	2.081	تم قياس الـ pH وحيد آتة ٤.٨

٢٨٥ ml = النموذج طسبت من التجربة

٥.٣٨ = الوزن الحاد للنموذج

٧- تجربة سيارع - د / ١١ / ١٩٩٨

وكانت النتائج - طول موجي 550 - 0.12

Time

Zero time - 0.56

24 hrs - 1.075

48 hrs - 1.290

72 hrs - 1.578

96 hrs - 2.180

النتائج - ٤.١٠٥ لتر

الوزن الجاف - ٤.٨

٤.8 pH

0.844

٨- تجربة سيارع - د / ١١ / ١٩٩٨

وكانت النتائج - طول موجي 550 - 0.12

Time

Zero time - 0.372

24 hrs - 0.644

48 hrs - 0.852

72 hrs - 0.9

النتائج - ٤.١٠٥ لتر

الوزن الجاف - ٤.٨

٤.8 pH

0.844

٩- تجربة سيارع - د / ١١ / ١٩٩٨

النتائج - ٤.١٠٥ لتر

الوزن الجاف - ٤.٨

٤.8 pH

0.844

10.0 دورة / دقيقة

550

Time - 0.12

Zero time - 0.250

24 hrs - 0.688

48 hrs - 1.098

72 hrs - 0.938

96 hrs - 0.903

النتائج - ٤.١٠٥ لتر

الوزن الجاف - ٤.٨

٤.8 pH

0.844

1.088 =

1. تجربہ شمار ۶/۱۱/۹۹

الغبار ۵

البراد ۵

Rpm ۱۰۰ دورہ / دقہ

النتج ۴٪

السرعة ۵۵۰ لتر / دقہ ۵ D

Time	OD	pH
------	----	----

Zero time	0.431	5.5
-----------	-------	-----

24 hrs	1.034	5.5
--------	-------	-----

48 hrs	1.130	5.2
--------	-------	-----

72 hrs	1.128	5.4
--------	-------	-----

96 hrs	1.155	5.2
--------	-------	-----

السرعة ۵۵۰ لتر / دقہ

النتج ۱۰، ۱۵ غم

٪ ۱، ۶، ۸

11. تجربہ شمار ۹/۱۱/۹۹

الغبار ۵

البراد ۵

Rpm ۱۵۰ دورہ / دقہ

النتج ۴٪

السرعة ۵۵۰ لتر / دقہ

OD ۵۵۰

Time	OD	pH
------	----	----

Zero time	0.586	5.4
-----------	-------	-----

24 hrs	0.936	
--------	-------	--

48 hrs	1.079	pH = 5.6
--------	-------	----------

72 hrs	0.990	
--------	-------	--

96 hrs	1.036	
--------	-------	--

120 hrs	1.071	
---------	-------	--

السرعة ۵۵۰ لتر / دقہ

النتج ۱۶، ۲۸ غم

٪ ۱، ۱۱، ۹۹

(١٢) تجربة سكرينج ١٢/١/٥٠

الغشاء ٥ كل ساعة

الزهر ٥ كل ساعة

٢٠٠ دورات / دقيقة R.P.M

الوقت ١-٤

١٠٠٠ دورات / دقيقة

الوسط لزج

٥٠٠ دورات / دقيقة

Time O.D

Zero time 0.586

24 hrs 0.747 ← النمو قليل جدا مع وجود بترغم

48 hrs 0.821

72 hrs 0.748

تم اضافة الخميرة بعد ذلك لان النتائج من ٢٠٠ دورات / دقيقة

١٠٠ دورات / دقيقة

٥٠٠ دورات / دقيقة

الوسط لزج

١٠٠ دورات / دقيقة

١٠٠ دورات / دقيقة

(١٣) تجربة سكرينج ١٣/١/٥٠

الغشاء ٥ كل ساعة

الزهر ٥ كل ساعة

٢٠٠ دورات / دقيقة R.P.M

١-٤

الوسط لزج

٥٠٠ دورات / دقيقة

Time O.D

Zero time 0.513

24 hrs 1.017 ← النمو قليل جدا

48 hrs 1.226 النمو اكثر قليلا مع وجود بترغم

72 hrs 1.174

PH = 5.6


الحجم الطبيعي = 50 مل

الوزن الجاف = 19.3 غم

2/9

[illegible]

الملاحظات	النسبة المئوية	الوزن الجاف	الحجم المولي	الحجم الوزني	Optical density "O.D." طول موجي 550	الحجم المولي	الحجم الوزني	سرعة الدوران RPM	الحجم المولي	الحجم الوزني
	%		الوزن الجاف	الحجم المولي	9.6 7.2 4.8 2.4 Zero hr. hr. hr. hr. time			دورة		
1 مطلق	1	1	1	1	0.08 1.143 1.09 1.05	1/2 لتر	10	1.45	1	1
2 مطلق	1	1	1	1	1.5 1.276 1.115 1.166 0.698	7/2 لتر	10	1	1	1
3 مطلق					2.24 1.72 1.465 1.252 0.73	1/2 لتر	10	1	1	1
4 مطلق	0.415				1.86 1.52 1.32 1.09 0.678	1/2 لتر	10	1	1	1
5 مطلق	0.47				1.83 1.587 1.282 1.098 0.619	1/2 لتر	10	1	1	1
6 مطلق	0.38				2.081 1.578 1.286 1.095 0.67	1/2 لتر	10	1	1	1
7 مطلق	0.844				2.124 1.578 1.290 1.075 0.56	1/2 لتر	10	1	1	1
8 مطلق					0.9 0.852 0.644 0.372	1/2 لتر	10	1	1	1
9 مطلق	1.18	1.6	1.6	1.6	0.903 0.938 0.98 0.682 0.250	1/2 لتر	10	1	1	1
10 مطلق	1.78	1.5	1.5	1.5	1.155 1.126 1.13 1.034 0.421	1/2 لتر	10	1	1	1
11 مطلق	1.071	1.99	1.7	1.8	1.038 0.99 1.079 0.936 0.586	1/2 لتر	10	1	1	1
12 مطلق	1.1	1.8	1.8	1.8	0.748 0.721 0.747 0.576	1/2 لتر	10	1	1	1
13 مطلق	1.9	1.9	1.9	1.9	1.174 1.226 1.017 0.513	1/2 لتر	10	1	1	1



Bacillus thuringiensis

variety galleriae «Pizawa»

Galleria melonella


← اسم الحشرة

Microbial control of
pests and plant

Diseases - 1970-1980

edited by

H.D. Burges.



Growth curve ①
 Time of sporulation ②
 Effect of nutrient ③

I: Growth Curve:

O.D. viable count

15 ml
 flask
 5 ml
 medium



8:30

12:30

4:30

8:30

shaking 150 rpm
 Temp. 30°C



Control 50

O.D. at
 zero time

O.D.

12:30

Gm. stain


V.C. + 8:30 Gm. stain

12:30

4:30

48 hrs

V.C. 10:00 Gm. stain



الجنين ١٥-١٦-١٩٩٢

منيت البكتريا على اطباق من *Nutrient agar* في ٢٥° لمدة ٤ ساعات وكذلك على *Nutrient broth* بعد ان غلت في حدة حرارية *Heat shock* وذلك بفتح انبوب من الحار المصل لعقم بالبكتريا وبعد ذلك يوضع الاجتر في ماء مغلي «عذبة» في ٢٨° لمدة ١ ساعة ومن ثم يلمع الى *Nutrient broth* بالبكتريا التي غلت في حدة حرارية وذلك للتحقق من تكون البكتريا الاخرى وانما فرصة للسوائل ان تكون في الوسط لفتح الاجتر
وتنبت لعنت البكتريا الى وسط *Nutrient agar* «Slant» لغرض التثبيت في انحاء مختلفة

الثلاثاء ١٦-١٧-١٩٩٢

1. Growth Curve

حضرت الوسط لزراعة *Nutrient broth* ووزعت لوسط في ٤ قارورات «Arm Flasks» وفي كل قارورة ٥٠ مل من الوسط المتناهي ونصب ذلك حضرت العالقة البكتيرية وذلك لاضافة ١٠ مل من الحار المصل لعقم البكتريا المزروعة في *Nutrient agar slant* مع املت ج. لتتأكد من صحة العالقة البكتيرية مما سبق فاما وبعد ذلك فتمت اذابة هذه العالقة في *Suspension* الى *Arm Flask* الثلاثة
اما لدرجة الرابع فتمت بفتح (Control) في *Shaker* لدرجة ٢٠° ونظم قمم الدوران الى ١٢٥ في حاضنة هوائية *Optical density* وسجرت $125 = \text{rpm}$ بعد ان تقا الى *Optical density* «O.D.» في لفتاف من حاضنة بقاء في الحار لتكون اولى بغير

الحيز بعد تشغيل لمدة ساعة. والوقت يكون مستقام
الـ Control. وكانت النتيجة في الـ Zero time طالات

1- 0.13

2- 0.14

0.13

3- 0.13

وبعد ذلك نتجج، لزيادة لا رسة إلى خاصية ليتم وقت لـ

0.0 بعد ساعات من طانة في ٢٠٢، rpm = 120

طانت كما يلي

1- 0.43

2- 0.42

0.41

3- 0.39

وبعد ٨ ساعات من طانة في الـ Shaker في ٢٠٢

و rpm = 120 طانت النتائج كما يلي

1- 0.90

2- 0.90

0.91

3- 0.94

بعد هذه القراءة، هناك خاصية للوسط الزرني حيث أمينا

أصل من الوسط الزرني إلى ٩ ملك من طام لظهر. وحسب القراءة

الزرنية بهذا يتاج القراءة x ١٠

وهذه لقراءة الأخيرة حسب بعد ٢٠ ساعة من طانة في الـ Shaker

علا أن الحال هو من استقام في الحيز يكون ٥٤

وكانت النتائج كما يلي

1- 0.515 x 10 = 5.1

2- 0.650 x 10 = 6.5

5.8

3- 0.608 x 10 = 6.0

وفي هذه الفترة الزمنية من طانة هناك حساب من الوسط البكرين

ونفسه رسة كرام وذلك لتبني الفترة الزمنية من الطانة

التي يتم في تكوين البورات Time of sporulation

الأربعاء ١٤١١/١٢/١٩٩٢

في ساعة إلى ١٠٣٠ صباحاً أي بعد ٤ ساعات من طعنة عكس

الخارج التالية (بعد ٤ ساعات من طعنة عكس ٢٠٠ rpm = 120)

Viable count

للخافض التالية 10^{-6} ، 10^{-7} ، 10^{-8}

Gram stain

صبغة كرام للصبغات البيرية من لدورات الطعنة

Optical density (O.D.)

وكانت القراءة كما يلي

1	0.614	$\times 10$	=	6.1	
2	0.666	$\times 10$	=	6.6	666
3	0.734	$\times 10$	=	7.3	

القراءة التالية بعد ٤ ساعات من طعنة عكس ٢٠٠ rpm = 120 في الجوز/كران

Shaker سرعة rpm = 120 وكانت طالتي

1	0.687	$\times 10$	=	6.8	
2	0.761	$\times 10$	=	7.6	75
3	0.816	$\times 10$	=	8.1	

القراءة التالية بعد ٢ ساعات طالت طالتي

1	0.736	$\times 10$	=	7.3	
2	0.646	$\times 10$	=	6.4	6.8
3	0.689	$\times 10$	=	6.8	

القراءة لثالثية لجد ٤٨ ساعة طابت طلاء

$$1. 0.529 \times 10 = 5.2$$

$$2. 0.494 \times 10 = 4.9 \quad 5.4$$

$$3. 0.625 \times 10 = 6.2$$

أضافة إلى على صلات لم يفر بصحة كتم

نتائج لـ Viable Count « ١ »

« ٢ » الورق الأول « رقم ١ »

$$10^{-6} = 132, 137 \quad 134.5$$

$$10^{-7} = 3.4, 1.7 \quad 25.5$$

$$10^{-8} = 1, 7, 3 \quad 3.6$$

$$10^{-6} \quad 134.5 \times 10 \times 10^6 = 0.1 \times 10^{10}$$

$$10^{-7} \quad 25.5 \times 10 \times 10^7 = 0.2 \times 10^{10}$$

$$10^{-8} \quad 3.6 \times 10 \times 10^8 = 3.6 \times 10^9$$

$$= 3.6 \times 10^9 = 2.5 \times 10^9$$

« ٢ » الورق الثاني « رقم ٢ »

$$10^{-6} = 23 = 23$$

$$10^{-7} = 2, 4 = 3$$

$$10^{-8} = 4, 1 = 2.5$$

$$10^{-6} \quad 2.3 \times 10 \times 10^6 = 0.2 \times 10^9$$

$$10^{-7} \quad 3 \times 10 \times 10^7 = 0.3 \times 10^9$$

$$10^{-8} \quad 2.5 \times 10 \times 10^8 = 2.5 \times 10^9$$

$$= 1 \times 10^9$$

٣. لدرجے بنائے "رقم 3"

$$\begin{aligned} 10^{-6} &= 45, 22, 40 = 35.6 \\ 10^{-7} &= 6, 8 = 7 \\ 10^{-8} &= 1, 2 = 1.5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 10^{-6} &= 35.6 \times 10^{-6} \times 10^6 = 0.3 \times 10^9 \\ 10^{-7} &= 7 \times 10^{-7} \times 10^7 = 0.7 \times 10^9 \\ 10^{-8} &= 1.5 \times 10^{-8} \times 10^8 = 1.5 \times 10^9 \end{aligned}$$

$$0.83 \times 10^9$$

النتیجہ لا 0.10 حد حفاظت 0.5 ساعة ثابت کلائی

$$\begin{aligned} 1-0.451 &\times 10 = 4.5 \\ 2-0.452 &\times 10 = 4.5 \quad 4.7 \\ 3-0.510 &\times 10 = 5.1 \end{aligned}$$

النتیجہ 1.715

نتیجہ 1. Viable Count (درجہ 1) ساعة حفاظت

5. لدرجے الاول "رقم 1"

$$\begin{aligned} 10^{-6} &= 34, 31, 30 = 31.6 \\ 10^{-7} &= 3, 1 = 2 \\ 10^{-8} &= 1, 1 = 1 \end{aligned}$$

10^{-6}	$31.6 \times 10 \times 10^6$	$= 0.3 \times 10^9$
10^{-7}	$2 \times 10 \times 10^7$	$= 0.2 \times 10^9$
10^{-8}	$1 \times 10 \times 10^8$	$= 1 \times 10^9$

0.5×10^9

ج۔ لزوف بنائے " ریم 2 "

10^{-6}	$27, 20, 26$	$= 24.3$
10^{-7}	$1, 2, 2$	$= 1.6$
10^{-8}	x, x, x	

10^{-6}	$24.3 \times 10 \times 10^6$	$= 0.2 \times 10^9$
10^{-7}	$1.6 \times 10 \times 10^7$	$= 0.1 \times 10^9$

0.1×10^9

ج۔ لزوف بنائے " ریم 3 "

10^{-6}	$29, 32, 32$	$= 31$
10^{-7}	$2, 9, 5$	$= 5.3$

10^{-6}	$31 \times 10 \times 10^6$	$= 0.3 \times 10^9$
10^{-7}	$5.3 \times 10 \times 10^7$	$= 0.5 \times 10^9$

0.4×10^9

optical density "OD."

Incubation time	Flask 1	Flask 2	Flask 3		
Zero time	0.13	0.14	0.13	0.13	
4 hr.	0.43	0.42	0.39	0.41	
8 hr.	0.90	0.90	0.94	0.91	
12 hr.	5.1	6.5	6.0	5.8	
24 hr.	6.1	6.6	7.3	6.6	
28 hr.	6.8	7.6	8.1	7.5	
32 hr.	7.3	6.4	6.8	6.8	
48 hr.	5.2	4.9	6.2	5.4	
52 hr.	4.5	4.5	5.1	4.7	

Viab.le count					
After 24 hr.	2.5×10^9	1×10^9	0.83×10^9	1.4×10^9	
Viab.le count					
After 48 hr.	0.5×10^9	0.1×10^9	0.4×10^9	0.3×10^9	

الأستاذ ١٧١٥ / ١٩٩٤

1. Growth curve

أُخذت البكتيريا من هذا السائل ووضعت في عائلتين مختلفتين suspension
من البكتيريا في ظروف مختلفة. الأولى Skat's والثانية في وسط هارت
Heal shock. وبعد ذلك نأخذ البكتيريا من الوسطين ونضعها في
منعش Nutrient broth ونأخذ منها البكتيريا ونقاسها optical density «O.D.»
للساعات الأولى. Central كانت الساعات الأولى
Zero time كالآتي

1- 0.323

2- 0.323

0.343

3- 0.385

وبعد ذلك نضع البكتيريا في الشاكر Shaker في درجة حرارة 35°C
ونأخذ منها البكتيريا في الساعات الأولى

قراءة O.D. بعد 4 ساعات صيانة كالآتي

1- 0.328

2- 0.319

0.359

3- 0.431

قراءة O.D. بعد 8 ساعات صيانة كالآتي

1- 1.864

2- 1.770

1.901

3- 2.070

قراءة O.D. بعد 24 ساعات صيانة كالآتي
مع عمل ساعات لونية كرام

1- 2.388

2- 2.335

2.392

3- 2.454

الامتداد ١٧٠١ / ١٧٩٩

قراءة الـ OD بعد ٤ ساعات حضارة ثابتة / كالاتي

1 - 1.940

2 - 2.528

3 - 0.783

2.234

عمل حسابات لقيمة كرام، ونفاذ لـ *Viable Count*

للتحسين 10^{-6} ، 10^{-7}

قراءة الـ OD بعد ٨ ساعات حضارة ثابتة / كالاتي

1 - 2.467

2 - 2.489

3 - 1.495

2.150

قراءة الـ OD بعد ٢٠ ساعات حضارة ثابتة / كالاتي

1 - 2.578

2 - 2.517

3 - 2.462

2.519

الامتداد ١٧٠١ / ١٧٩٩

قراءة الـ OD بعد ٤٨ ساعات حضارة ثابتة / كالاتي

1 - 2.162

2 - 2.324

3 - 2.506

2.330

عمل حسابات لقيمة كرام، ونفاذ لـ *Viable Count* للتحسين 10^{-6} ، 10^{-7}

نتائج Variable Count

10^{-6} 10 12 x = 11

10^{-7} 18 x x

$$10^{-6} = 11 \times 10 \times 10^6 = 0.1 \times 10^9$$

النتيجة الأولى

10^{-6} 5 6 12 = 7.6

10^{-7} 25 x x

$$10^{-6} = 7.6 \times 10 \times 10^6 = 0.07 \times 10^9$$

النتيجة الثانية

10^{-6} 3 30 8 = 19

10^{-7} 1 2 3 = 2

$$10^{-6} = 19 \times 10 \times 10^6 = 0.1 \times 10^9$$

$$10^{-7} = 2 \times 10 \times 10^7 = 0.2 \times 10^9$$

$$0.15 \times 10^9$$

النتيجة الثالثة

قراءة نتائج Variable Count للثلاثية

لثلاثية 18 ساعة

النتيجة الأولى

10^{-6} 30 x x

10^{-7} 2 10 2 = 4.6

$$10^{-7} = 4.6 \times 10 \times 10^7 = 0.4 \times 10^9$$

ج. لورق ہائی

$$10^{-6} = 31, 33, 33 = 32.3$$

$$10^{-7} = 6, 9, 8 = 7.6$$

$$10^{-6} = 32.3 \times 10 \times 10^6 = 0.3 \times 10^9$$

$$10^{-7} = 7.6 \times 10 \times 10^7 = 0.7 \times 10^9$$

$$= 0.5 \times 10^9$$

ج. لورق ہائی

$$10^{-6} = 41, 43, 48 = 44$$

$$10^{-7} = 15, 15, 10 = 13.3$$

$$10^{-6} = 44 \times 10 \times 10^6 = 0.4 \times 10^9$$

$$10^{-7} = 13.3 \times 10 \times 10^7 = 1.3 \times 10^9$$

$$= 0.85 \times 10^9$$


optical density "O.D."


Incubation time	Flask 1	Flask 2	Flask 3	
Zero time	0.323	0.323	0.385	0.343
4 hr	0.328	0.319	0.431	0.359
8 hr	1.864	1.770	2.070	1.901
12 hr	2.388	2.335	2.454	2.392
24 hr	1.940	2.528	0.783	2.234
28 hr	2.467	2.489	1.495	2.150
32 hr	2.578	2.517	2.462	2.519
48 hr	2.162	2.324	2.506	2.330

population after 48 hr.

Viable Count after 24 hr.	0.1×10^9	0.07×10^9	0.15×10^9	0.1×10^9
---------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------

Viable Count after 48 hr.	0.4×10^9	0.5×10^9	0.85×10^9	0.5×10^9
---------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------





جميع المزيج البكتيري ونفك له تركيز في مركز المحرار المركزي - Center Page

6000 rpm - لمدة 20 min - وبعد ذلك نغزل في رانسيد واضغطنا

30 ml من الماء المقطر، لغعم ونمزجه جيداً وذلك لزيادة تركيز البكتريا

وبعد ذلك نحسب البكتريا بطريقة (Total Count) فكانت النتائج

في الطيات البعيدة 6.3 ، 7.2 ، 6.2 ، 7.5 ، 7.0 ، 6.8

6.8 $\times 10^9$ Cell/ml

Culture media (عربي)

10^9 200 ml 200 gm

10^8 20 ml 200 gm استقبلنا التاكيد

10^7 2 ml 200 gm البكتريا في حجرة

10^6 0.2 ml 200 gm

وبعد ذلك نضاهي بركات الحشرات واختبار تأثير البكتريا على البركات

و بعد ذلك تم عمل تخفيف للعائلتين المركزتين الاخيرتين
 10^{-6} و 10^{-7} و 10^{-8} و تم عمل اختبار *Count* عائلتهما
 بعد العلم انهما قبل اخضاعهما للعائلتين المركزتين الى *medium* و الجواب
 عن ذلك هو عدم هزاجته *Heat shock* و ذلك لفضل طينها و طينته و لذلك
 تم عمل اختبارها لتبين

السياسة ١١ ١٧ ١٩٩٢

نتائج تجريبية مختبر طين في طين طلائع
 نسبة لفل

Control		6.6	%
1×10^6		10	%
1×10^7		53.5	%
1×10^8		78.5	%

طائنت نتائج (١) *Count* عائلتهما

جريت تجريبية اخرى وهي طلائع

تمتد في عائلتين *Suspension* و ذلك بإضافة مادة مضافه الى طين

طينتين *Heat shock* و بعد ذلك عمل لهما

بإضافة مادة مضافه الى طينتين و طينتين و طينتين و بعد ذلك

١ - مل من العائلتين المركزتين الى ٥ مل من الوسط *Nutrient broth*

٢ - ١٢٥ للـ العائلتين قبل تليغ الدورق الحقير بل الوسط 2.389×10^8

٣ - الدورق في *Shaker* بدرجة 30°C و 150 rpm لمدة

48 ساعة


١٣ - ١٧ - ١٩٩٢

الاجتياز

نخرج لورق من *Shaker* بعد ان حركته لمدة ٤٨ ساعة ونقيس *OD* قفازته لسنية $OD =$ ونقول له ال *Viable Count* وبعد ذلك نلجج له صدمة حرارية *Heat shock* ونضيف الى ستة دوارق في كل ٥٠ *ml* من *Nutrient broth* كميات مختلفة من لورق الزرع لورق لورق لورق ونقيس ال *OD* لهذه الدوارق لسنية في ال *Zero time* ونلجج لقفز لاتي



1 ml



Suspension of *Bacillus*

50 ml of media

After Heat shocking

"Nutrient broth"

" $OD = 2.389$ "

"48 hr. Incubation"

0.5 ml "Culture" ($30^{\circ}C$, rpm = 150)



50 ml

"media"

"48 hr. $30^{\circ}C$, rpm = 150"

Viable Count
or
OD

1 ml "Culture"



50 ml

"media"

"48 hr. $30^{\circ}C$, rpm = 150"

1.5 ml "Culture"



50 ml

"media"

"48 hr. $30^{\circ}C$, rpm = 150"

Heat shock
($80^{\circ}C$, 10 min)

2 ml "Culture"



50 ml

"media"

"48 hr. $30^{\circ}C$, rpm = 150"

Read OD

after Zero time

2.5 ml "Culture"




50 ml

"media"

"48 hr. $30^{\circ}C$, rpm = 150"

3 ml "Culture"



50 ml

"media"

"48 hr. $30^{\circ}C$, rpm = 150"

After 48 hr. Incubation

Read OD & viable Count

قيمتي تقياس الـ OD للدورتين الأولى الـ (stock) وديا الـ OD = 2.345
 وكذلك على الـ viable count التي قيمتها 10^6 و 10^7
 وكذلك قيمته الـ OD للدورتين الـ الستة بعد إضافة الحالة ليكن الـ
Zero time وكانت حالاته:

- 1) 0.5 ml culture , OD = 0.041
 2) 1 ml culture , OD = 0.077
 3) 1.5 ml culture , OD = 0.179
 4) 2 ml culture , OD = 0.158
 5) 2.5 ml culture , OD = 0.250
 6) 3 ml culture , OD = 0.293

تمت في يوم السبت ١٠/١٢/١٩٩٥ في الـ Shaker لمدة ٤٨ ساعة، ٢٠°C
 و 150 rpm

النتائج

نتيجة التخفيف الـ stock كانت حالاته:

10^{-6} = 9, 10, 11 = 10
 10^{-7} = 4, 5, 4 = 4.3

10^{-6} = $1.0 \times 1.0 \times 10^6$ = 1×10^8
 10^{-7} = $4.3 \times 1.0 \times 10^7$ = 4.3×10^8

2.65×10^8

الأربعاء ١٩٩٢/٧/١٥

استخرجت لدورات لستة من الـ Shaker وعملت الـ viable count
للخامات 10^{-6} و 10^{-7}
وكذلك قياس الـ Optical density «O.D.» وكلفت طالات

O.D. after 48 hr. Incubation

1) 0.5 ml Culture	O.D. = 2.415
2) 1.0 ml Culture	O.D. = 2.434
3) 1.5 ml Culture	O.D. = 2.434
4) 2.0 ml Culture	O.D. = 2.415
5) 2.5 ml Culture	O.D. = 2.395
6) 3.0 ml Culture	O.D. = 2.395

الخميس ١٩٩٢/٧/١٦

نتائج الـ viable count

0.5 ml Culture	
10^{-6}	19 6 23 = 21
10^{-7}	1 6 3 = 2
$21 \times 10 \times 10^6$	$= 2.1 \times 10^8$
$2 \times 10 \times 10^7$	$= 2 \times 10^8$
	$= 2 \times 10^8$

1.0 ml Culture	
10^{-6}	15 6 11 = 13
10^{-7}	3 6 1 = 2
$13 \times 10 \times 10^6$	$= 1.3 \times 10^8$
$2 \times 10 \times 10^7$	$= 2 \times 10^8$
	$= 1.65 \times 10^8$

1.5 ml Culture

$$10^{-6} \quad 20 \quad 18 \quad = \quad 19$$

$$10^{-7} \quad 3 \quad 5 \quad = \quad 4$$

$$19 \times 10 \times 10^6 = 1.9 \times 10^8$$

$$4 \times 10 \times 10^7 = 4 \times 10^8$$

$$= 2.95 \times 10^8$$

2 ml Culture

$$10^{-6} \quad 22 \quad 14 \quad = \quad 18$$

$$10^{-7} \quad 1 \quad 4 \quad = \quad 2.5$$

$$18 \times 10 \times 10^6 = 1.8 \times 10^8$$

$$2.5 \times 10 \times 10^7 = 2.5 \times 10^8$$

$$= 2.15 \times 10^8$$

2.5 ml Culture

$$10^{-6} \quad 30 \quad 30 \quad = \quad 3.0$$

$$10^{-7} \quad 3 \quad 2 \quad = \quad 2.5$$

$$3.0 \times 10 \times 10^6 = 3 \times 10^8$$

$$2.5 \times 10 \times 10^7 = 2.5 \times 10^8$$

$$= 2.75 \times 10^8$$

3 ml Culture

$$10^{-6} \quad 23 \quad 14 \quad = \quad 18.5$$

$$10^{-7} \quad 1 \quad 7 \quad = \quad 4$$

$$18.5 \times 10 \times 10^6 = 1.8 \times 10^8$$

$$4 \times 10 \times 10^7 = 4 \times 10^8$$

$$= 2.9 \times 10^8$$

Optical Density

Samples	O.D after Zero time	O.D after 48 hr. Inc.	viabk count after 48 h. Inc.
Stock culture		2.345	2.65×10^8
First Flask With 0.5 ml Culture	0.041	2.415	2×10^8
Second Flask With 1 ml Culture	0.077	2.434	1.65×10^8
Third Flask With 1.5 ml Culture	0.179	2.434	2.95×10^8
Fourth Flask With 2 ml Culture	0.158	2.415	2.15×10^8
Fifth Flask With 2.5 ml Culture	0.250	2.395	2.75×10^8
Sixth Flask With 3 ml Culture	0.293	2.395	2.9×10^8

Viabk Count تعداد البقية وذات لمع وجود اى فرق تم ل
 وتمت البقية المحيطة به (تم) وسط تباين آخر هو السوس


يؤخذ لترين وبيسج *Filtration*
 وذلك للتحقق من الحزببات الغير لينة
 ولبعد ذلك يضاف اليه 1.5 g من
 ال C.S.L «حزمة لينة»
 «لترين 25% - حزمة 75%»
 وبعد ذلك يحقن المتبقى



Suspension of Bacteria
 ↓
 Heat shock


يبلغ عدد جين من كل تركيز وسيعمل
 الال من قياسات *viable count*
 بعد 24 ساعة صيانة أما لبيان
 صيد 24 ساعة صيانة *viable count*

0.5 ml




50 ml «دفعات لترين 50 ml في ال C.S.L»

1.0 ml




50 ml

1.5 ml




50 ml

2.0 ml




50 ml

2.5 ml



50 ml

3.0 ml



50 ml

Samples	Viabale Count	Viabale Count
	after 24 hr Inc	after 48 hr Inc
first flask With 0.5 ml Culture	0.85×10^8	1.05×10^8
Second flask With 1.0 ml Culture	0.875×10^8	5×10^8
Third flask With 1.5 ml Culture	0.66×10^8	3.85×10^8
Fourth flask With 2.0 ml Culture	0.88×10^8	3.2×10^8
Fifth flask With 2.5 ml Culture	1.25×10^8	4.35×10^8
Sixth flask With 3.0 ml Culture	1.615×10^8	3.65×10^8

أعداد العنصرية تكونت السلسلة غير معدة تقسيم جيد وحياتية إلى وقت
 تقسيم أفضل

المعيار ١٩٩٢/٧-١-٢٢

يؤخذ بترسين وتريشج filtration للمعيار

0.5 ml

من الحرة ثبات لعين لتأليه ولبعد ذلك يضاف

لبن 1.5 g/l - 1.5 ml C.S.L «مادة لينة»

«بترسين» 7-5 - 4 - ماء مقطر 1.5 - 1.5

ولبعد ذلك يقيم لتنج

50 - 50 مل بترسين + 50 مل ماء مقطر



Suspension of Bacteria



Heat shock


قبل يقيم بترسين «لبن لتأليه» 5 - 1.5 ml C.S.L

بعد ذلك pH 6.8 - 7.0

ويقيم في Autoclave لمدة 15 دقيقة


50 ml «د- 50 بترسين» 5 - 1.5 ml «C.S.L»

1.5 ml




50 ml

2.0 ml



50 ml

3.0 ml




50 ml

الإعداد ١٩٩٢/٧-١-٢٢

الساعات ١٥ - 30 °C Shaken rpm = 150

Samples	Viable Count after 48 hr. Inc.
First flask With 0.5 ml Culture	5.2×10^8
Second flask With 1.5 ml Culture	6.1×10^8
Third flask With 2.0 ml Culture	4.8×10^8
Fourth flask With 3.0 ml Culture	3.3×10^8

لا يمكن الاعتماد على هذه النتائج وذلك لأنه الـ Control ملوث ببكتريا الـ
 Bacillus (g-m) والـ Bacillus (g-m) الملونة للحيوان
 لذلك حضرت الوسط لزركي المبيد والذي سقيت من ليشين المرسج بواسطة
 الـ filtration والحالات :-



هذه النتائج معقمة في الـ
 هذه النتائج معقمة في الـ
 في كل مرة 15 min و 120
 وبين مرة واحدة في الـ
 تلك الحالات تصير

الدواء المختبره في ٥.٠ مل «سنتي ٧.٥»	V.C. / 24-hr.	V.C. / 24-hr.	V.C. / 48-hr.	V.C. / 48-hr.
Once steril.	Twice steril.	Once steril.	Twice steril.	
Flasks With 0.5 ml Culture	0.7×10^8	2.9×10^8	0.4×10^8	2.05×10^8
Flasks With 1.5 ml Culture	0.5×10^8	2.15×10^8	1.15×10^8	2.2×10^8
Flasks With 2.0 ml Culture	2.5×10^8	4.7×10^8	2.9×10^8	3.9×10^8
Flasks With 3.0 ml Culture	2.6×10^8	4.6×10^8	4.3×10^8	4×10^8

نتائج Viable Count للمختبر بعد معالجته ٤ ساعة و ٨ ساعة

المجموع	ماء مقطر	شرب	C.S.L
250	187.5	62.5	0.375
5.00	3.75	1.25	0.75
10.00	7.50	2.50	1.5

النسبة ١-٨-١-١

جمع المزرعة البكتيرية المعقم مرتين وعلى تركيز في ١-٨-١-١

و بعد ذلك علقه بالتراب في ٥.٠ مل ماء المقطر المعقم

و بعد ذلك علقه في ٥.٠ مل ماء المقطر المعقم

Total count للمخفف 10^{-3} وكانت النتيجة

4×10^{10}

1995/11/16

نتيجة الـ Viable Count

$$10^{-8} = 5.6 = 5.5 \times 10^9$$

$$10^{-9} = 4.5 = 4.5 \times 10^{10}$$

$$10^{-10} = 2 = 2 \times 10^{11}$$

$$10^{-8} = 5.5 \times 10^9 \text{ Cell 1 ml}$$

$$\left. \begin{array}{l} 5.5 \times 10^9 \\ 1 \times 10^9 \end{array} \right\} \times = 0.18 \rightarrow 1 \text{ ml}$$

$$0.18 \times 200 = 3.6 \rightarrow 1 \times 10^9$$

$$3.6 + 200 = 203.6 \rightarrow 1 \times 10^8$$

$$0.36 + 200 = 200.36 \rightarrow 1 \times 10^7$$

أصبحت هذه الكمية ما طرزت في الجريبس واجساد بحرية في مختبر الحشرات

لنرى طلاقة أعيننا النتيجة (4.5 x 10¹⁰) ففصم المذاكير المستعدة في التجربة

$$1 \times 10^{10} \text{ يتحول إلى } 1 \times 10^9$$

$$1 \times 10^9 \text{ " " " " } 1 \times 10^8$$

$$1 \times 10^8 \text{ " " " " } 1 \times 10^7$$

	Kill % After 48hr Inc.	Kill % After 72hr Inc.
Control	10 %	10 %
1 x 10 ⁸	28 %	30 %
1 x 10 ⁹	36 %	42 %
1 x 10 ¹⁰	64 %	86 %

الاجراء ١٩٩٠ - ١٨ - ١٩

المرتببة المتبقية من الحشرات وطانة *Viable Count* المتبقية هو 1.5×10^9

١٠⁸ → جرعة ١٠ جم ١ مل

جرعة ١٠٠ جم ١٠ مل

جرعة ٢٠٠ جم ٢٠ مل

١٠⁷ → جرعة ١٠٠ جم ١ مل

جرعة ٢٠٠ جم ٢ مل

وطانة نتائج *Bio assay* بعد ٢٤ ساعة طلاء

نسبة لقتل ١٢٪ Control

٨٦٪ 1×10^7

١٠٠٪ 1×10^8

البيان ١٩١٤/١٩١٥

Inoculum dilution	1 %	2 % 100 ml	3 % 100 ml	4 %
10^{-5}	1.67	225	220, 235	
10^{-6}	8, 1.8	23, 29, 39	28, 45	8, 15
	1.3×10^8	3×10^8	3.5×10^8	
	1.7×10^8	2.25×10^8	2.3×10^8	1.15×10^8

$$2.8 \times 10^8$$

حلتا، لستغ، فبالتركيبي 2% و 3% ورئت النتائج إلى (10 ml - 1)

وقته إلى viable count تجيدت إلى 2.8×10^9

$$0.4 \text{ ml} \Rightarrow 1 \times 10^9$$

$$1 \times 10^9 = 0.4 \times 200 = 80 \text{ ml culture} + 200 \text{ gm عربى}$$

$$1 \times 10^8 = 8 \text{ ml} + 200 \text{ gm}$$

$$1 \times 10^7 = 0.8 \text{ ml} + 200 \text{ gm}$$

التأثير	Kill after 48 hr.	Kill after 72 hr.	
Control	2 %	2 %	
1×10^7	80.5 %	80.5 %	(١٤) قتال لا توجد برفقة
1×10^8	85.2 %	100 %	(١٦) قتال لا توجد برفقة

البيت

لغت - ا - ل - ن - م - ل - و - ن - ط - ل - ز - ر - ع - (250 ml - شربت) + 750 ml - عار و مقبل +

سنگ 1.5 - مقابل C.S.L. - لہوئے پ - 3% - من - الم شروع - لہوئے پ

B.t. galleries ————— وحيث ان Viable count ————— وطائفت الشايج

$$\frac{10^{-6}}{8.2 \cdot 49 \cdot 75} \times$$

10-7 9 7 9 →

$$10^{-8} \quad 4, 12, 7 \quad x$$

لا جد ذلك قلت - تركت للدعوى التي - دبل - Center Page - وركزت النماذج على

viability count 1-250-100 ml

10-7

37

10-8

22

24

109

2-1

8.

-1 ml

2.3

X-10-

X-

1-X-

0

-X-

$$1 \times 10^{10}$$

1

-B-L-

ml

23

10
10

4

100

$$-1-\lambda$$

d

2

نمبر پستی - ۱۱

a-4.

100

12

1

0-8.

2.00

١١٠٠

0.4

100

4

10.

(درجہ اول)

الأربعاء ١٤١٠/١١/١٩٩٢

التراكيز	Killing after 48 hr.	Killing after 72 hr.
Control	8 %	8 %
1×10^7	20.4 %	23.2 %
1×10^8	64 %	74 %
1×10^9	94 %	100 %

الخميس ١٤١٠/١١/١٩٩٢

أُجريته تجريبية لـ Bioassay على الفئران التي تقبى سبع أسابيع
 للمبيد الاحمر دم المستورد المصنوع في ألمانيا المراكيز التالية:
 ١) ٠.٢ ml → 200 جم
 ٢) 2 ml → 200 جم
 ٣) 20 ml → 200 جم


مطابقتها السابع كالاتي (د. Sandoz) (د. 401-B)

المطارات	النسبة المئوية الفئران بعد ٤٨ ساعة	النسبة المئوية الفئران بعد ٧٢ ساعة	النسبة المئوية الفئران بعد ٩٦ ساعة
Control	Zero %	Zero %	Zero %
١) ٠.٢ ml	20 %	23.3 %	33.3 %
٢) 2 ml	16.6 %	20 %	30 %
٣) 20 ml	26.6 %	30 %	56.6 %

Stir 30 min.

add slowly while stirring

4 vol. acetone



Stir 30 min.

let to stand 10 min.



Filter with suction


Filtrate

"discard"

Residue



Stir with small volume acetone



Filter with suction

Filtrate

"discard"

Residue



Stir with small volume acetone



Filter with suction

Filtrate

"discard"

Residue



Dry over night

الأربعاء ١٠/١٠/١٩٩٩

تم حساب البرزخ لطاف المزروع للبكتيريا الناتج بعد عملية التحسين
بـ ١٠٠٠٠٠٠٠ = ١٠^٧ ع

الخميس ١١/١٠/١٩٩٩

أجريت تجربة حساب *Viable Count* للسحرة للبكتيريا
الناتج مما ذكره سبقة

الجمعة ١٢/١٠/١٩٩٩

نتائج الـ *Viable Count*

10^{-7}	112	141	173	142	1.4×10^{10}
10^{-8}	24	20	14	22	2×10^{10}
10^{-9}	14	17	5	16	1.2×10^{11}

Viable Count

$$2 \times 10^{10}$$

الأحد ١٤/١٠/١٩٩٩

أجريت تجربة لـ *Bacterospore* في حشرات عو طابت في صناديق
اللافي







2×10^9	→	1	10	→	3	30
2×10^8	→	1	100			
2×10^7	→	0.5	500			
2×10^6	→	0.1	1000			

أجريت هذه التجربة من قبل طيحات
الطبيب على الذين حصلوا في المختبر والتأثير هو الطبيب
الهلندي والذين يسمى *Bactospine*

المستبح

المعادن	Kill after 48 hr	Kill after 48 hr		Kill after 72 hr	Kill after 72 hr
	المبيد الحشري	المبيد لمستورد	إلتراكين	المبيد الحشري	المبيد لمستورد
جرعة / غم المبيد	المختبر	Bactospine		المختبر	Bactospine
3 : 30	96.6 %	96.6 %	10^9	100 %	100 %
1 : 100	96.6 %	80 %	10^8	100 %	93.3 %
0.5 : 500	70 %	23.3 %	10^7	80 %	36.6 %
0.1 : 1000	53.3 %	13.3 %	10^6	63.3 %	20 %
Control	16.6 %				

تبریکات



و بعد المزاج حیدر صفات الاستیون و ذب لغزها بحسب المار من الرأب و بریح الشایع
و بعد ذب ذب الشایع لیکن و یسحق لغزها اصل بلای مسحوق المبد

الدشنة

١٩٩٤ / ١١ / ١٤

نوع الخافض *de-lutein* للسوق لحبات الـ 10^{-8} كمية
وتنوع من الخافض لا حصر له من *Nutrient* طرية انواع من
المبيات المتعلقة بزيادة

- (١) لاكتوز مستورد
- (٢) لاكتوز باستعمال كحول نقي
- (٣) لاكتوز باستعمال كحول مستعمل
- (٤) لاكتوز منتج محليا
- (٥) ماء مقطر

النتيجة عدد الخلايا لفترة عدد خلايا المتدعمة

(١) لاكتوز مستورد	12	3
	17	2
(٢) لاكتوز باستعمال كحول نقي	4.0	6
	2.1	6
(٣) لاكتوز باستعمال كحول مستعمل	38	14
(٤) لاكتوز منتج محليا	19	4
(٥) ماء مقطر	22	16

الاحمر ١٥ / ١١ / ١٩٩٤

أصفياء تريم الـ *Binary* للبكتيريا المختبرية باستعمال لاكتوز مستورد
للتكرار 10^8 حبة أصفيا ١ غم ٤ غم «ميرسيو» 10^{-8} نت
Viable Count 1.9×10^{10}

Bioassay

نتائج الـ

Control 10 %
Kill after 48 hr 90 %
Kill after 72 hr 100 %

Triton في الحبارك القادمة تستعمل المبيد مخففاً مع المولاس والـ
نسبة اعم من مبيد كـ (- x - 100)

واستعملنا الاضافات التالية

«المبيد» «المريش»

المبيد	المريش	9
10 ml	100 gm	10^9
1 ml	100 gm	10^8
0.1 ml	100 gm	10^7

الموزع في ٢٠٥		Viabile	Kill after 48hr			Kill after 72hr			Control
F	L	Count	10^7	10^8	10^9	10^7	10^8	10^9	
Zero time	8-11	2×10^{10}	70%	96.6%	96.6%	80%	100%	100%	16.6%
After 15 days	22-11	1.6×10^{11}	13.3%	43.3%	100%	43.3%	90%	100%	6.6%
After 30 days	6-12	3×10^{12}	56.6%	86.6%	93.3%	63.3%	90%	100%	3.3%
After 45 days	20-12	2.9×10^{10}	40%	50%	86.6%	66.6%	60%	93.3%	6.6%
After 60 days	3-1-93	1×10^{10}							
After 81 days	24-1-93	2×10^8	60%	100%	100%	83%	100%	100%	6.6%
After 95 days	7-2-93	3.5×10^8	50%	93.3%	96.6%	73.3%	100%	100%	0.0%
After 109 days	21-2-93	7×10^8	26.6%	73.3%	100%	43.3%	76.6%	100%	0.0%
After 123 days	7-3-93	3×10^8	23.3%	36.6%	53.3%	33.3%	63.3%	83.3%	0.0%
146	28-3-93	4×10^8	43.3%	50%	83.3%	46.6%	63.3%	100%	10%
160	11-4-93	2.9×10^8	36.6%	36.6%	76.6%	50%	56.6%	93.3%	3.3%
175	25-4-93	2×10^8	30%	50%	96.6%	53.3%	76.6%	96.6%	0.0%
190	9-5-93	4×10^8	30%	40%	83.3%	40%	66.6%	100%	6.6%
205	24-5-93	2.5×10^8	23.3%	46.6%	93.3%	30%	80%	100%	3.3%
220	6-6-93	1.3×10^8	33.3%	63.3%	93.3%	50%	93.3%	100%	6.6%
235	20-6-93	2.5×10^8	33.3%	66.6%	93.3%	33.3%	93.3%	100%	0.0%
270	26-7-93	3.2×10^8	6.6%	33.3%	63.3%	16.6%	63.3%	73.3%	0.0%
285	9-8-93	1×10^7	53.3%	86.6%	73.3%	76.6%	100%	96.6%	

LD:50 / time → الموزع (نقطة اصابة)

المؤزج تحت المجهر		Viability	Kill after 48hr			Kill after 72hr			Control
ملاحظة: F 2		Count	10^7	10^8	10^9	10^7	10^8	10^9	
Zero time	26-11	1.6×10^{11}	13.3%	43.3%	100%	43.3%	90%	100%	6.6%
After 15 days	10-12	1×10^9	46.6%	63.3%	100%	60%	86.6%	100%	6.6%
After 30 days	24-12	2×10^8	36.6%	83.3%	96.6%	40%	93.3%	100%	6.6%
After 45 days	7-1-93	4×10^8	23.3%	70%	96.6%	33.3%	76.6%	100%	3.3%
After 60 days	28-1-93	3×10^8	73.3%	86.6%	100%	80%	93.3%	100%	6.6%
After 75 days	11-2-93	1.3×10^9	33.3%	83.3%	90%	73.3%	93.3%	96.6%	0.0%
After 90 days	25-2-93	2.2×10^8	40%	60%	90%	63.3%	83.3%	100%	0.0%
115	1-4-93	2.5×10^8	30%	30%	73.3%	46.6%	50%	100%	3.3%
130	15-4-93	4×10^8	36.6%	73.3%	96.6%	56.6%	86.6%	100%	3.3%
145	29-4-93	2×10^8	13.3%	83.3%	100%	23.3%	90%	100%	3.3%
160	13-5-93	7×10^7				76.6%	86.6%	96.6%	0.0%
175	27-5-93	2×10^8	46.6%	56.6%	96.6%	46.6%	60%	96.6%	3.3%
190	10-6-93	0.9×10^8	16.6%	30%	66.6%	20%	40%	90%	6.6%
205	24-6-93	2×10^8	6.6%	23.3%	93.3%	16.6%	50%	100%	0.0%
240	28-7-93	2×10^7	10%	10%	46.6%	13.3%	23.3%	46.6%	0.0%
255	12-8-93	3×10^6	16.6%	40%	93.3%	20%	66.6%	100%	
270	25-8-93	1.5×10^6				33.3%	83.3%	96.6%	0.0%
285	5-9-93	1.4×10^8	6.6%	46.6%	63.3%	33.3%	63.3%	73.3%	

بسم الله الرحمن الرحيم


Control	الربط التدرج	النتيجة	تأخر الإنتاج
1.6-6%	1.0-1.5	2.62 gm	2.1-1.0-9.2
3.3-1%	1.0-1.5	2.62 gm	1.29-1.1-9.2

Bacillus thuringiensis galmariae


خبریا منزل

[illegible]


75 ml H_2O }
 225 ml Yeast } 300 ml
 0.45 gm C.S.L.
 0.03 gm yeast extract
 (0.1 g/l)




75 ml H_2O }
 225 ml Yeast } 300 ml
 0.45 gm C.S.L.
 0.15 gm yeast extract
 (0.5 g/l)



75 ml H_2O }
 225 ml Yeast } 300 ml
 0.45 gm C.S.L.
 0.3 gm yeast extract
 (1.0 g/l)




75 ml H_2O }
 225 ml Yeast } 300 ml
 0.45 gm C.S.L.
 (Zero yeast extract)



[illegible]

الحسين ١٩٩٥ / ١٥ / ١٩٩٥



100 ml 100 ml 100 ml 100 ml 100 ml

125 ml سترن

375 ml سترن


C.S.L gm

0.75 gm

yeast extract

0.25 gm

5.00 ml



100 ml 100 ml 100 ml 100 ml 100 ml

125 ml سترن

375 ml سترن

C.S.L

0.75 gm

yeast extract

Zero

500 ml

			V.C. after 48 hr.			V.C. after 72 hr.		
Zero yeast extract	1.		1.5	$\times 10^8$		1	$\times 10^8$	
	2.		3	$\times 10^8$		2.5	$\times 10^8$	
	3.		1	$\times 10^8$		5	$\times 10^8$	
0.5 g/l yeast extract	1.		5	$\times 10^8$		2	$\times 10^8$	
	2.		2.5	$\times 10^8$		4	$\times 10^8$	
	3.		1.5	$\times 10^8$		3	$\times 10^8$	
10 → 100		10^7	Kill after 48 hr.			Kill after 96 hr.		
1 → 100		10^6	Control	10^5	10^6	10^7	10^5	10^6
0.1 → 100		10^5						
Zero yeast extract	6.6%	3.3%	33.3%	63.3%	13.3%	66.6%	100%	
0.5 g/l yeast extract			20%	36.6%	36.6%	40%	86.6%	93.3%

الحسين ١٠٨ / ١ / ١٤٢٨ هـ

أعيت لجنه سابقه لمره ثانية
مطابقه نتائجها

MgSO ₄ 7H ₂ O g/l	V.C. 48 hr.	V.C. 72 hr.	^{10⁶} Bicassay 48 hr.	^{10⁶} Bicassay 72 hr.	Control	Spores % 48 hr.	Spores % 72 hr.
0.05	2.5×10^8	2.3×10^8	50 %	66.6 %	10 %	29.09 %	44.8 %
0.1	4.8×10^8	5.5×10^8	60 %	76.6 %		36.7 %	75.3 %
0.25	6.8×10^8	3×10^8	60 %	66.6 %		40.17 %	71.7 %
0.3	1.8×10^8	4.6×10^8	73.3 %	90 %		38.1 %	63.8 %
0.4	2.4×10^8	3.5×10^8	53.3 %	80 %		38.2 %	64.9 %
0.5	4.6×10^8	5.7×10^8	43.3 %	60 %		59.8 %	86.1 %
Zero	3.6×10^8	3.5×10^8	36.6 %	43.3 %		42.6 %	67 %

C.S.L. = 1

7.4 = الوزن لجانب لكل مل

100 7.4

x 0.75

$$x = \frac{75}{7.4}$$

10 ml / l

C.S.L. I

10 ml / l

20 ml / l

30 ml / l

40 ml / l

50 ml / l

C.S.L. «المستودع»

0.75 g / l

1.5 g / l

2.25 g / l

3.0 g / l

3.75 g / l

C.S.L. II

2.1 = الوزن لجانب لكل مل

100 2.1

x 0.75

$$x = \frac{75}{2.1}$$

3.7 ml / l

C.S.L. II

C.S.L. «المستودع»

3.7 ml / l

7.4 ml / l

11.1 ml / l

14.8 ml / l

18.5 ml / l

0.75 g / l

1.5 g / l

2.25 g / l

3.0 g / l

3.75 g / l

3.7×10^8 Control

$$\left. \begin{array}{l} 3.7 \times 10^8 \\ 5.9 \times 10^8 \end{array} \right\} \times = \frac{3.7 \times 10^8}{5.9 \times 10^8} = 0.6 \text{ ml}$$

« II 3.75 »

$$\left. \begin{array}{l} 3.7 \times 10^8 \\ 1.1 \times 10^9 \end{array} \right\} \times = \frac{3.7 \times 10^8}{1.1 \times 10^9} = 0.03 \text{ ml}$$

« II 2.25 »

$$\left. \begin{array}{l} 3.7 \times 10^8 \\ 1.28 \times 10^9 \end{array} \right\} \times = \frac{3.7 \times 10^8}{1.28 \times 10^9} = 0.2 \text{ ml}$$

« II 0.75 »

$$\left. \begin{array}{l} 3.7 \times 10^8 \\ 3.4 \times 10^9 \end{array} \right\} \times = \frac{3.7 \times 10^8}{3.4 \times 10^9} = 0.1 \text{ ml}$$

« I 3.0 »

$$\left. \begin{array}{l} 3.7 \times 10^8 \\ 6.9 \times 10^8 \end{array} \right\} \times = \frac{3.7 \times 10^8}{6.9 \times 10^8} = 0.5 \text{ ml}$$

« I 0.75 »

I 0.75 ① 0.5 ml = 2.5 ml → 50 gm مريض
 I 3.0 ② 0.1 ml = 0.5 ml → 50 gm مريض
 II 0.75 ③ 0.2 ml = 1 ml → 50 gm مريض
 II 2.25 ④ 0.03 ml = 0.15 ml → 50 gm مريض
 II 3.75 ⑤ 0.6 ml = 3 ml → 50 gm مريض
 C.S.L. 15g/l ⑥ 1 ml = 5 ml → 50 gm مريض
 (Control)

3.7×10^7 صحت دار است. لکه

C.S.L - I

النسبة

C.S.L الستور g/l	C.S.L ml/l	Viable Count 48 hr.	Viable Count 72 hr.	Bioassay 48 hr. 1 ml → 10 ⁸ (13.7 × 10 ⁸)	Bioassay 96 hr. 1 ml → 10 ⁸ (13.7 × 10 ⁸)	Control	Spores % 48 hr.	Spores % 72 hr.
0.75	10	1×10^8	6.9×10^8	80 %	96.4 %	10 %	24.6 %	55 %
1.5	20	1.6×10^8	6.3×10^8				12.2 %	50 %
2.25	30	1.9×10^8	4.3×10^9				34.8 %	64.3 %
3.0	40	2.2×10^8	3.4×10^9	43.3 %	53.3 %		38.6 %	35.3 %
3.75	50	1.6×10^8	7.7×10^8				67.8 %	79.4 %

C.S.L - II

0.75	37	2.3×10^8	1.2×10^9	46.6 %	80 %		23.2 %	49.7 %
1.5	74	2.4×10^8	2.2×10^9				24.6 %	55.9 %
2.25	111	2.5×10^8	1.1×10^{10}	36.6 %	50 %		48.6 %	50.4 %
3.0	148	1.4×10^8	8.1×10^8				57.5 %	65.2 %
3.75	185	1.8×10^8	5.9×10^8	70 %	86.6 %		44.3 %	45.3 %

C.S.L - الستور

1.5 g/l

1.5 21 l	1.7×10^8	3.7×10^8	90 %	96.6 %		58.2 %	75.6 %
-------------	-------------------	-------------------	------	--------	--	--------	--------

نقار التفرقة بعد تركيز C.S.L I و C.S.L II معان الوزن

الحاف

الوزن الحاف للـ C.S.L I = 26.79 gm / 100 ml

$$\left. \begin{array}{l} 26.79 \\ 0.75 \end{array} \right\} \begin{array}{l} 100 \\ x \end{array} \quad x = \frac{75}{26.79} = 2.7 \text{ ml / l}$$

$$2.7 \text{ ml / l} = 0.75 \text{ g / l}$$

$$5.4 \text{ ml / l} = 1.5 \text{ g / l}$$

$$8.1 \text{ ml / l} = 2.25 \text{ g / l}$$

$$10.8 \text{ ml / l} = 3.0 \text{ g / l}$$

$$13.5 \text{ ml / l} = 3.75 \text{ g / l}$$

الوزن الحاف للـ C.S.L II = 20.9 gm / 100 ml

$$\left. \begin{array}{l} 20.9 \\ 0.75 \end{array} \right\} \begin{array}{l} 100 \\ x \end{array} \quad x = \frac{75}{20.9} = 3.5 \text{ ml / l}$$

$$3.5 \text{ ml / l} = 0.75 \text{ g / l}$$

$$7 \text{ ml / l} = 1.5 \text{ g / l}$$

$$10.5 \text{ ml / l} = 2.25 \text{ g / l}$$

$$14 \text{ ml / l} = 3.0 \text{ g / l}$$

$$17.5 \text{ ml / l} = 3.75 \text{ g / l}$$

$$C.S.L \rightarrow 1.5 \text{ g / l}$$

C.S.L I				C.S.L II		
المسورد C.S.L g/l	C.S.L ml/l	Viable Count 48 hr	Viable Count 72 hr	C.S.L ml/l	Viable Count 48 hr	Viable Count 72 hr
0.75	2.7	6.2×10^8	6.5×10^8	3.5	2.3×10^8	1×10^8
1.5	5.4	4.5×10^8	3×10^8	7	3.5×10^8	4×10^8
2.25	8.1	1.8×10^8	3×10^8	10.5	4.3×10^8	7.5×10^8
3.0	10.8	4.7×10^8	1.4×10^9	14	4.8×10^8	3×10^8
3.75	13.5	4.1×10^8	3×10^8	17.5	3.0×10^8	4×10^8

C.S.L g/l المسورد

C.S.L	6×10^8	4×10^8
1.5 g/l		

نتائج تربية بوم الحيتان - مصادر ٢٥-١-٢٠١٢

C.S.L. I

الوزن الجاف C.S.L. g / l	C.S.L. ml / l	Viable Count After 48 hr.	Viable Count After 72 hr.
0.75	2.7	5.1×10^8	4.7×10^8
1.5	5.4	4.8×10^8	3.9×10^8
2.25	8.1	5.6×10^8	3.9×10^8
3.0	10.8	7.4×10^8	6.9×10^8
3.75	13.5	6.2×10^8	7.5×10^8
1.5		1.7×10^9	4.8×10^8

نتائج تربية بوم الحيتان - مصادر ٢٥-١-٢٠١٢

C.S.L. II

الوزن الجاف C.S.L. g / l	C.S.L. ml / l	Viable Count After 48 hr.	Viable Count After 72 hr.
0.75	3.5	2.9×10^8	3.5×10^8
1.5	7.0	6.2×10^8	7.1×10^8
2.25	10.5	3.5×10^8	5.9×10^8
3.0	14	6.5×10^8	4.2×10^8
3.75	17.5	7.3×10^8	3.6×10^8
1.5	9.1	3×10^8	3×10^8

نتائج تجزئة يوم السبت ١٣ / ٣ / ١٩٢٢

الوزن الجاف لـ C.S.L g/l	$\frac{1}{2}$ C.S.L I + $\frac{1}{2}$ C.S.L II ml l	V.C. 48 hr.	V.C. 72 hr.
0.75	C.S.L I 1.35 ml/l	C.S.L II 1.75 ml/l	3.2×10^8
1.5	C.S.L I 2.7 ml/l	C.S.L II 3.5 ml/l	2.4×10^8
2.25	C.S.L I 4.05 ml/l	C.S.L II 5.25 ml/l	4.0×10^8
3.0	C.S.L I 5.4 ml/l	C.S.L II 7.0 ml/l	2.8×10^8
3.75	C.S.L I 6.75 ml/l	C.S.L II 8.75 ml/l	3.0×10^8

عدد التوتيرات
الوسط المتزايد
ولم تنجح صاب
البنية

نتائج تجزئة يوم الأحد ١٤ / ٣ / ١٩٢٢

الوزن الجاف C.S.L g/l	$\frac{1}{2}$ C.S.L I + $\frac{1}{2}$ C.S.L II ml / l	Viable Count — 72 hr.	
0.75	C.S.L I 1.35 ml / l	C.S.L II 1.75 ml / l	2.28 $\times 10^9$
1.5	C.S.L I 2.7 ml / l	C.S.L II 3.5 ml / l	1 $\times 10^9$
2.25	C.S.L I 4.05 ml / l	C.S.L II 5.25 ml / l	1.6 $\times 10^9$
3.0	C.S.L I 5.4 ml / l	C.S.L II 7.0 ml / l	5.1 $\times 10^8$
3.75	C.S.L I 6.75 ml / l	C.S.L II 8.75 ml / l	البنية ملوثة

نتائج تجربة حيوالا - ١٤ / ٤ / ١٩٨٨

الوزن طابت له C.S.L. g/l	$\frac{1}{2}$ C.S.L. I + $\frac{1}{2}$ C.S.L. II ml 1 l	V.C. 48 hr.	V.C. 72 hr.
0.75	C.S.L. I C.S.L. II 1.35 ml/l 1.75 ml/l		2.5×10^8
1.5	C.S.L. I C.S.L. II 2.7 ml/l 3.5 ml/l	3.1×10^8	3.5×10^8
2.25	C.S.L. I C.S.L. II 4.05 ml/l 5.25 ml/l	9.6×10^8	3.7×10^8
3.0	C.S.L. I C.S.L. II 5.4 ml/l 7.0 ml/l	2.4×10^8	2.4×10^8
3.75	C.S.L. I C.S.L. II 6.75 ml/l 8.75 ml/l	2.4×10^8	2.4×10^8

نتائج تجربة حيوالا - ١٤ / ٤ / ١٩٨٨

الوزن طابت له C.S.L. g/l	$\frac{1}{2}$ C.S.L. I + $\frac{1}{2}$ C.S.L. II ml 1 l	V.C. 48 hr.	V.C. 72 hr.
0.75	C.S.L. I C.S.L. II 1.35 ml/l 1.75 ml/l	X	6.5×10^8
1.5	C.S.L. I C.S.L. II 2.7 ml/l 3.5 ml/l	3.4×10^8	4.9×10^8
2.25	C.S.L. I C.S.L. II 4.05 ml/l 5.25 ml/l	1.7×10^8	8.1×10^8
3.0	C.S.L. I C.S.L. II 5.4 ml/l 7.0 ml/l	1.4×10^8	3.8×10^8
3.75	C.S.L. I C.S.L. II 6.75 ml/l 8.75 ml/l	2×10^8	4.9×10^8

ظمان لـ pH للموسم الرئيسي بعد البقعة Auto clave

بعد أمطاره أيضا B.t.g 6.34

pH بعد طمانه لـ ساعة 7.98

pH بعد طمانه لـ ساعة 7.92

pH بعد طمانه لـ ساعة 8.52

Batch no 1

Date 20-4-93

-1. noocular = 3 1/2

Media = 3.5 liter

10.5 Liter مار و مقطر

37.8 ml C.S.L. I

49-5 ml C.S.L. II

Time	pH	Viable Count	
Zero time	6.23		
24 hr. Incub.	6.23	2×10^8	الموت قليل، الهزيبا عميرة الحجم لم حيث تكون السبورات داخلية Endospores في هذه الفترة ما الحصانة
48 hr. Incub.	7.3	2×10^8	الموت قليل، الهزيبا مكونة للسبورات الداخلية Endospores
72 hr. Incub.	8.0	1×10^8	السبورات قليلة وتكون ما 2.0 اقلية البكتيرية Exospores

14 liter culture yielded

48 gm.

3.42 gm / liter

Variable Count = 1.5×10^{12}

0.25 gm / 25 gm pentonite = 1 : 100

$$\frac{1.5 \times 10^{10}}{1} \times \frac{1}{9} = \frac{1 \times 10^6}{1.5 \times 10^{10}} = \underline{0.00007 \text{ spores/g}}$$
$$1 \times 10^8$$

				Kill 48 hr.	Kill 72 hr.	control
0.07 g	1 Kg	✓	1×10^6	10%	16.6%	6.6%
0.7 g	1 Kg	✓	1×10^7	20%	26.6%	
0.7 g	100 g	✓	1×10^8	40%	63.3%	
7 g	100 g	✓	1×10^9	86.6%	93.3%	

Batch NO 2

Date 16-5-1993

Inoculum = 3%

Media = 3.5 liter

10.5 liter

37.8 ml

49 ml

C.S.L. I

C.S.L. II

Zero time

pH = 5.5

NaOH 6.9 pH 1.5

After 48 hr. Incubation

pH = 7.74

الموت بعد 48 ساعة من التخمير

Exposure 5.000.2 spore/g

Endospores

After 72 hr. Incubation

pH = 8.41

Viable Count = 5.6×10^8

14 liter Culture yielded = 41 gm (2.92 gm/l)

Viable Count = 5×10^{12}

0.25 gm 1.25 gm pentonite (1.2.100.0)

5×10^{10} 1 g 1×10^6 5.000.2 spore/g

1×10^6

powder	جرم	بتركيز	Kill After 48 hr	Kill after 72 hr	Control
0.02 gm	1 Kg	1×10^6	20%	30%	3.3%
0.2 gm	1 Kg	1×10^7	23.3%	36.6%	
1 gm	5.00 gm	1×10^8	16.6%	43.3%	
2 gm	1.00 gm	1×10^9	56.6%	73.3%	

Batch No 3

Date 26-5-1993

Inoculum = 3%

Media = 3.5 liter

10.5 liter

37.8 ml 0.3 l I

49 ml 0.5 l II

Zero time pH = 5

جميع الـ pH كـ 7.0 وذلك بإضافة الـ NaOH

24 hr Incubation pH = 6.31

المو قليل - طاريا معينة لمحج

72 hr Incubation

pH = 8.4

V.C = 1.7×10^8 المتوفيل والسورات

المكثورة قليلة ومهورة اختيارية لكل طاريا والسورات الناتج

عن مزيج غير مسببة في النمو (الم سبغة الحد الآن)

اما فعالية الـ Toxins فمكتورة في عدة مزيج (Bassay) الخلية السور

14 liter Culture yielded = 47 gm (3.35 gm/l)

Viable count = 5.5×10^9

0.25 gm 1 25 gm pentonite (1:100)

$5.5 \times 10^9 \times 12.7 \times \frac{1 \times 10^6}{5.5 \times 10^9} = 0.00018$ spore/g

$1 \times 10^6 \times$

powder	جرسي	بتا كيز	Kill after 48 hr.	Kill after 72 hr.	Control
0.18 gm	1 Kg	1×10^6	33.3%	36.6%	6.6%
0.5 gm	500 gm	1×10^7	13.3%	13.3%	
1 gm	100 gm	1×10^8	33.3%	53.3%	
5 gm	50 gm	1×10^9	43.3%	86.6%	

الأرياء ٩ / ٦ / ١٩٩٢

نتائج تجريبية لـ *Brassica* لحادة كذا Batch 2

powder	مريش	لتر اكتر	Kill after 48 hr.	Kill after 72 hr.	Control
0.02 gm	1 Kg	1×10^6	33.3 %	4.0 %	6.6 %
0.2 gm	1 Kg	1×10^7	26.6 %	46.6 %	
1 gm	500 gm	1×10^8	20 %	4.0 %	
2 gm	100 gm	1×10^9	46.6 %	80 %	

Batch No. 4

Date 28 - 8 - 93

Inoculum = 3%

Media = 3.75 liter

11.25 liter

40.5 ml C.S.L. I

52.5 ml C.S.L. II

Zero time pH = 6.3

4.8 hrs Incubation

pH = 8.0

المخبرية لا توجد عتبات مخبرية
السوائل الخارجية Exposed مخزنة بالعبوات

viable count = 4×10^8

15 liter Culture yielded = 52.6 gm

= 3.5 g/l

viable count = 1.6×10^{11}

0.5 gm / 50 gm pentonite (1:100)

$$\left. \begin{array}{l} 1.6 \times 10^{11} \\ 1 \times 10^6 \end{array} \right\} \times \frac{1 \times 10}{1.6 \times 10^{11}} = 0.00062 \text{ spore/gm}$$

powder	جرية	التركيز	القتل بعد 2 ساعة %	القتل بعد 4 ساعة %	Control %
0.62 gm	1 Kg	1×10^6	20	23.3	0.0
3 gm	500 gm	1×10^7	10	13.3	
3 gm	50 gm	1×10^8	40	73.3	
30 gm	50 gm	1×10^9	90	100	

	تاريخ الملاحظة	ملاحظات التفتيش	Variable Count	Kill 48hr			Kill 72hr			cool rel. 7.
				10^7	10^8	10^9	10^7	10^8	10^9	
150	12-12-93	10^6 : 2, 1, 2 10^7 : x, 1, x	2×10^7	6.6	13.3	53.3	13.3	23.3	9.0	1.0
165	27-12-93	10^6 : 1, 1, 5 10^7 : x, 1, x, x	2×10^7	20	33.3	53.3	4.0	53.3	63.3	0.0
180	9-1-94	10^6 : 2, 1, x 10^7 : x, 1, x, x	1×10^7	6.6	3.0	8.0	1.0	56.6	96.6	0.0
195	23-1-94	10^5 : 21, 10, 12 10^6 : 3, 3, 2	1.4×10^7	20	30	43.3	2.0	56.6	66.6	0.0
210	7-2-94	10^5 : 14, 13, 22 10^6 : 2, 2, 1	1.6×10^7	26.6	33.3	66.6	36.6	63.3	93.3	13.3
225	21-2-94	10^5 : 21, 30, 14 10^6 : 4, 4, 7	2.1×10^7	26.6	43.3	80	43.3	70	100	10
240	5-3-94	10^5 : 16.6, 12, 5 10^6 : 11, 7, 61	1.0×10^7	10	53.3	73.3	30	76.6	100	3.3
255	20-3-94	10^5 : 5, 14, 56 10^6 : 2, 4, x	2.5×10^7	30	53.3	96.6	36.6	66.6	96.6	3.3
270	3-4-94	10^5 : 11, 11, 8 10^6 : 4, 1, 1	1×10^7	23.3	26.6	83.3	23.3	60	96.6	3.3

تاريخ التوقيع ١٩٩٢-٦-٢٤

0.7 g/l

7 9 1 2 (1 x 10¹⁰)

42 9 1 6 1 1 5 1 «. حوله من

6-1-1 Triton-X-100.

	تاریخ اجراء تجربه	عدد الحشرات في التجربة	Viable Count	Killing after 48 hr. %			Killing after 72 hr. %			Control %
				10^7	10^8	10^9	10^7	10^8	10^9	
Zero	26-7-93	10^8 : 13, 10, 10 10^9 : 2, 1, 2	1.1×10^{10}	13.3	50	83.3	20	70	96.6	0.0
15	9-8-93	10^8 : 1, 2, x, 3 10^9 : x, x, x, x	1.5×10^9	13.3	56.6	96.6	40	76.6	100	
30	25-8-93	10^7 : 3, 1, 1, x 10^8 : x, x, x, x	1×10^8				63.3	93.3	100	0.0
45	5-9-93	10^6 : 80, 72, 75 10^7 : 8, 11, 6	8.3×10^8	3.3	13.3	56.6	10	56.6	93.3	0.0
60	19-9-93	10^6 : 89, 42, 44, 20 10^7 : 4, 4, 4, 1	4.3×10^8				13.3	43.3	90	0.0
75	3-10-93	10^6 : 20, 38, 22, 8 10^7 : 7, 6, 2, 6	2.2×10^8	6.6	20	56.6	13.3	36.6	73.3	0.0
90	17-10-93	10^6 : 88, 68, 117, 34 10^7 : 10, 5, 20, 3	7.1×10^8	20	13.3	66.6	20	26.6	80	3.3
105	31-10-93	10^6 : 34, 12, 33 10^7 : 50, 22, 44	2.6×10^8	13.3	26.6	46.6	13.3	50	83.3	0.0
120	14-11-93	10^6 : 4, 5, x 10^7 : x, x, x	3×10^7	23.3	30	33.3	33.3	46.6	70	0.0
135	23-11-93	10^6 : 42, x, x 10^7 : 2, x, 2	2×10^8	3.3	10	33.3	3.3	16.6	26.6	0.0

C.S.L.

Tl

1	16.03	}	15.98	Dry weight 1.100 ml
2	15.84			
3	16.07			

15.98

100

0.75

x

x

75

15.98

4.69 ml/l

4.69 ml/l = 0.75 g/l

9.38 ml/l = 1.5 g/l

14.07 ml/l = 2.25 g/l

18.76 ml/l = 3.0 g/l

23.45 ml/l = 3.75 g/l

C.S.L.

T

1	66.47	}	67.0	Dry weight 1.100 ml
2	67.14			
3	67.50			

67.0

100

0.75

x

x

75

67

1.1 ml/l

1.1 ml/l = 0.75 g/l

2.2 ml/l = 1.5 g/l

3.3 ml/l = 2.25 g/l

4.4 ml/l = 3.0 g/l

5.5 ml/l = 3.75 g/l

درجہ لہیان درجہ مقاومت امار مختلفہ منہ ہرقات لیسہ ہلینہ اظہر ہتہ

نتائج تجربہ مع الامار ۱۸ / ۱۰ / ۱۹۹۶

	3 days		10 - 12 days		20 - 25 days	
	% Kill 48 hrs.	% Kill 72 hrs.	% Kill 48 hrs.	% Kill 72 hrs.	% Kill 48 hrs.	% Kill 72 hrs.
1×10^7	100	—	20	20	0.0	0.0
1×10^8	100	—	13.3	26.6	0.0	6.6
1×10^9	100	—	66.6	80	6.6	10
Control	100	—	3.3	3.3	0.0	0.0

نتائج تجربہ مع الامار ۹ / ۱۰ / ۱۹۹۶

	10 - 12 days		20 - 25 days	
	% Kill 48 hrs.	% Kill 96 hrs.	% Kill 48 hrs.	% Kill 96 hrs.
1×10^7	1.0	2.0	0.0	6.6
1×10^8	16.6	6.6	0.0	3.3
1×10^9	60	100	13.3	13.3
Control	0.0	0.0	0.0	0.0

Batch No 5

Date 11-11-93

Inoculum 3%

Section _____ 3

9.

13.2

56.1

Zero time

pH = 6.7

4.8 hrs. Incubation

p.m. = 7:1

72 Incubation

pH = 7.4

9.6 hrs Incubation

pH _____ = 7.3

همزة السكت على حرف اللام بحرف الهمزة

[illegible]

~~D. 10 gm. acetone $\Rightarrow$ 10 gm. pentane (1:1)~~

(2) $\xrightarrow{10 \text{ Jan.}} 20 \text{ Jan.} \quad (1, 2)$

3. 10 gms $\Rightarrow$ 30 gms (1, 3)

④ $10 \text{ gm} \xrightarrow{\quad} 40 \text{ gm} \quad (1, 4)$

5) 10 gms $\rightarrow$ 50 gms (1-1.5)

over night ۵۰۰۰ لقمه

طیابہ و قند و شکر

سؤال (1, 3) - Variable Count

 9.5×10
$$9,5 \times 10^9 \times 3$$
$$2.85 \times 10^3$$

$$\frac{2.8 \times 10^{10}}{1 \times 10^9} = 2.8 \times 10^1$$

$$1 \times 10^9 \times$$

$$\frac{1 \times 10^9}{2.8 \times 10^{10}} = 0.035 \text{ cell/g}$$

$$0.035 \text{ g} \Rightarrow 1 \text{ g} \quad 1 \times 10^9$$

$$3.5 \text{ g} \Rightarrow 100 \text{ g} \quad 1 \times 10^9$$

$$0.35 \text{ g} \Rightarrow 100 \text{ g} \quad 1 \times 10^8$$

$$0.175 \text{ g} \Rightarrow 500 \text{ g} \quad 1 \times 10^7$$

Expt. No.	% Kill	% Kill	
	48 hrs.	72 hrs.	
1×10^7	30	50	
1×10^8	76.6	96.6	
1×10^9	83.3	100	
Control	0.0	0.0	

نتایج بررسی (ب) ۱۳۰۱/۱۱/۱۹۹۲

	10-12 days		20-25 days	
دوره	% Kill 48 hrs	% Kill 72 hrs	% Kill 48 hrs	% Kill 72 hrs
1×10^7	23.3	33.3	0.0	0.0
1×10^8	3.0	96.6	0.0	6.6
1×10^9	33.3	70	3.3	6.6
Control	0.0	0.0	0.0	0.0

نتایج بررسی (ب) ۱۳۰۱/۱۱/۱۹۹۲

	3 days		3 days	
دوره	% Kill 48 hrs	% Kill 72 hrs	% Kill 48 hrs	% Kill 72 hrs
1×10^7	9.0	100	8.0	100
1×10^8	96.6	100	86.6	100
1×10^9	100	100	96.6	100
Control				

Batch No 6

Date 27 11 93

Inoculum 3%

Media 3 liter

9 liter

13.2 ml

CSL I

56.1 ml

CSL II

Zero time

pH 6.5

24 hrs Incubation

pH 7.8

Endospores

Viable Count

1×10^9

160.6 gm

(1, 1, 3)

481.8 gm

641.6 gm

5.30 gm

Viable Count

8.7×10^8

طريقة	% Kill 48 hrs.	% Kill 72 hrs.	
1×10^7	2.0	23.3	
1×10^8	16.6	23.3	
1×10^9	5.0	73.3	
Control	0.0	0.0	

Batch No 7

Date : 28-12-93

Inoculum : 3%

Media : 6 liter Whey

6 liter D.W

13.2 ml CSL I

56.1 ml CSL II

Zero time : pH : 6.9

After 24 hrs Incubation pH : 7.0

After 48 hrs Incubation

pH : 8.2

الملاحظة : كانت نسبة البكتيريا قليلة جداً في البداية وازدادت كثيراً بعد 48 ساعة من الحضانة (نسبة البكتيريا 7.0)

فتمت البكتيريا في البداية 1.5

ملاحظة : كانت البكتيريا في البداية 1.5

المختبرات

١٤٢٧/٢٨ ١٩٦٢/١

أهمية تجريبية على تجارب جديا العمل

وذلك - تحضير تركيز مختلفة من مبيد البزاق (V.C. 1×10^{10})

١. ٩٥ ml D.W. $\leftarrow$ ١٠ ml من تركيز 1×10^9 - (١٠ ml من تركيز 1×10^{10})

٢. ٩٥ ml D.W. $\leftarrow$ ١٠ ml من تركيز 1×10^8 - (١٠ ml من تركيز 1×10^9)

٣. ٩٥ ml D.W. $\leftarrow$ ١٠ ml من تركيز 1×10^7 - (١٠ ml من تركيز 1×10^8)

٤. ٩٥ ml D.W. $\leftarrow$ ١٠ ml من تركيز 1×10^6 - (١٠ ml من تركيز 1×10^7)

وبعد ٢٤ ساعة - قاتل من التامير ليل تركيز أحييت اليك مرقبات حرة

الفضل (١٠ يوم)

Kill after (21 days) Mean

النتائج

١) ٠% ٠%

٢) ٠% ٠%

٣) ٠% ٠%

٤) ٠% ٠%

1×10^6 ١) ٣٥% ٥٧.٥%

٢) ٧٥% ٥٧.٥%

٣) ٦٥% ٦٥%

٤) ٦٥% ٦٥%

1×10^7 ١) ١٠٠% ٦٦.٢٥%

٢) ٥٠% ٦٦.٢٥%

٣) ٣٠% ٦٦.٢٥%

٤) ٨٥% ٦٦.٢٥%

1×10^8 ١) ٤٥% ٥٧.٥%

٢) ٧٢% ٥٧.٥%

٣) ٦٥% ٥٧.٥%

٤) ٥٥% ٥٧.٥%

1×10^9 ١) ١٠٠% ٩٧.٥%

٢) ١٠٠% ٩٧.٥%

٣) ٩٠% ٩٧.٥%

٤) ١٠٠% ٩٧.٥%

Batch No 8

Date 9-1-94

Inoculum 3%

Media 1 3 liter Whey

4 liter P.W

13.2 ml C.S.I

56.1 ml C.S.II

Zero time pH = 6.9

24 hrs Incubation pH = 7.9

المحتوى الحيوي الأكثر من 1.50 من قبل الحبيبات
Viable Count 3.6×10^8 Endospores

11 liter Culture yielded 36 gm

3.2 gm / l

Viable Count 4.7×10^{12}

0.25 gm 1 25 gm penicillin (1:100)

$$\frac{4.7 \times 10^{10}}{1 \times 10^6} \times \frac{1 \times 10^6}{4.7 \times 10^{10}} = 0.0002 \text{ spores/g}$$

Powder	جرعة	لبن الكس	Kill 48hrs %	Kill 72hrs %	Control
0.01 gm	500 gm	1×10^6	10	10	10
0.1 gm	500 gm	1×10^7	10	16.6	
0.2 gm	100 gm	1×10^8	33.3	53.3	نمواذج الحيوية بمعدلات
2 gm	100 gm	1×10^9	30	60	
0.01 gm	500 gm	1×10^6	26.6	40	0.0
0.1 gm	500 gm	1×10^7	23.3	33.3	
0.2 gm	100 gm	1×10^8	20	53.3	
2 gm	100 gm	1×10^9	60	80	

تاريخ ١٥/١/١٩٩٤

تجربة التلقيح

حيث ربيحت التلقيح متراكمة خرافة من التلقيح (المرافقة)

التلقيح المتتالي

١ - 10^9 (١٠ مل من التلقيح) (١٠ مل من ماء مقطر)

٢ - 10^8 (١٠ مل من التلقيح) (١٠ مل من ماء مقطر)

٣ - 10^7 (١٠ مل من التلقيح) (١٠ مل من ماء مقطر)

٤ - 10^6 (١٠ مل من التلقيح) (١٠ مل من ماء مقطر)

وتجربتي التلقيح (١٠ - ١٠) إلى التلقيح من قبله مع حقن

النتائج

	Kill after (8 days)	Mean
Control	١ ٠ %	
	٢ ٥ %	١١.٢٥ %
	٣ ٣٠ %	
	٤ ١٠ %	
1×10^6	١ ٤٠ %	
	٢ ١٥ %	٢٣.٧٥ %
	٣ ١٥ %	
	٤ ٢٥ %	
1×10^7	١ ٢٠ %	
	٢ ٢٥ %	٣٠ %
	٣ ٤٠ %	
	٤ ٣٥ %	
1×10^8	١ ٦٠ %	
	٢ ٥٥ %	٥٥ %
	٣ ٥٥ %	
	٤ ٥٠ %	
1×10^9	١ ٣٥ %	
	٢ ٤٠ %	٤٠ %
	٣ ٥٥ %	
	٤ ٣٠ %	

الدرجيات

1/1/67

تم اعادة تجربة اصابة المبيد الحشري (دراوند) في تجارب ضد الحشرات

و بنسب التركيز 10⁶ 10⁷ 10⁸ 10⁹ و نسبة قتل الحشرات

التجارب المعاملة الاولى و ذلك لترى نسبة القتل في جميع منوع الحشرات

بعد 25 يوم من المعاملة (10-15 يوم) و ذلك لتبين نسبة قتل الحشرات في حور

المعتمدين في الزراعة

Kill after 25 days

Mean

Control

1	0.0 %	
2	0.0 %	0.0 %
3	0.0 %	
4	30 %	
1 x 10 ⁶	40 %	
2	40 %	43.3 %
3	50 %	
4	20 %	
1 x 10 ⁷	10 %	
2	20 %	16.6 %
3	20 %	
4	70 %	
1 x 10 ⁸	50 %	
2	50 %	5.0 %
3	50 %	
4	60 %	
1 x 10 ⁹	60 %	
2	40 %	66.6 %
3	70 %	
4	70 %	

تجربة استمينا) مقابلة من الحواس (الاصناف) كـ I و II و C.S.L. ١١
 عما آت الوزن في طاف للحواس ١٠٠٪

العدد	الفرقة الثانية	الفرقة الثالثة	الفرقة الرابعة	الفرقة الخامسة	الفرقة السادسة
٠.٥ g/l	4.6×10^8	6.8×10^8	3.7×10^8		5.0×10^8
Control	4×10^8	2.6×10^8	5.2×10^8		3.9×10^8
١.٠ g/l	1.8×10^8	3.0×10^8	2.6×10^8		2.4×10^8
Control	2.5×10^8	2.7×10^8	2.5×10^8		2.5×10^8
١.٥ g/l	3.6×10^8	7.4×10^8	4.5×10^8		5.1×10^8
Control	2.3×10^8	4.4×10^8	2.6×10^8		3.1×10^8
Control	1.9×10^8				1.9×10^8
٠.٥ g/l	3.6×10^8	2.6×10^8			3.1×10^8
١.٠ g/l	1.7×10^8	1.6×10^8			1.6×10^8
١.٥ g/l	3.5×10^8	3.3×10^8			3.4×10^8

الوصية بالتمريض: أي ما تم طه... استعملت تراكيب مختلفة من نشا...

10^5	20	7	83	74	65	7.1	$\times 10^7$
10^6			24	15	15	6	
10^5	30	7	16	13	12	5.3	2.3×10^7
10^6			2	3	1	2	
10^5	40	7	33	27	26	3.5	3×10^7
10^6			6	7	6	1.5	

Run no 1

استعملت تراكيب مختلفة من نشا starch

20 g/l 15 g/l 10 g/l 5 g/l

1) 5 g/l	10^8	144	116	102	
	10^9	35	35		3.5×10^{11}
2) 10 g/l	10^8	159	160	67	
	10^9	68	68	65	6.7×10^{11}
3) 15 g/l	10^8	247	211	206	
	10^9	89	73	30	5.7×10^{11}
4) 20 g/l	10^8	85	92	90	
	10^9	14	23	11	1.6×10^{11}

ملاحظة: استعملت تراكيب مختلفة من نشا Bioassay
 10^9 10^8 10^{12} 10^{11}
 6.7×10^{11}

Run No 2

5 g/l

10^8 4.4 2.8 1.25 1.23 3.0 $\times 10^{10}$
 10^9 1 1 X X

10 g/l

10^8 77 10.9 6.3 5.0 7.4 $\times 10^{10}$
 10^9 7 4 1.3 1.6

15 g/l

10^8 13.1 11.0 9.2 17.6 1.2 $\times 10^{11}$
 10^9 3 7 2 3

20 g/l

10^8 4 3 1 4 3.0 $\times 10^9$
 10^9 X 1 1 1 X

نتائج اختبار Biorass

Run No	V. Count	7 Kill 48 hrs		7 Kill 72 hrs		Control	
		10^8	10^9	10^8	10^9		
Run No. 1	1×10^{12}	13.3	26.6	33.3	40	3.3	أعطيت هذه الجرعة ووجدت
Run No. 2	1×10^{11}	30	16.6	33.3	26.6	3.3	أعطيت هذه الجرعة ووجدت
Run No. 1	1×10^{11}	6.6	6.6	10	6.6	0.0	النتائج غير دقيقة
Run No. 2	1×10^{10}	20	6.6	23.3	10	0.0	والتي كانت في جرعة
							الحيوية

Run no 4

Viable Count = 5×10^{10}

Bioassay

	1 Kill 48 hr	1 Kill 72 hr	Control
1×10^8	3.3	3.3	0.0
1×10^9	13.3	16.6	

Run no 5

Viable Count = 1×10^{10}

Bioassay

تأثير الجاهل في نسبة قوت الجير الحثري

Amino acid	Food			Food + Bacteria (micro)			Food + Bacteria + Amino acid 0.01%			Food + Bacteria + Amino acid 0.05%			
	7. Kill after			7. Kill after			7. Kill after			7. Kill after			
	24	48	72	24	48	72	24	48	72	24	48	72	
L- Glutamic acid	0.0	0.0	0.0	33.3	60	96.6	33.3	33.3	100	23.3	83.3	100	0.2 gm Bacteria ↓
DL- Alanine	3.3	3.3	3.3	30	93.3	100	36.6	100	100	36.6	80	100	100 gm food
L- leucine	0.0	0.0	0.0	33.3	100	100	46.6	43		13.3	66.6		
Folic acid													

أضيف الجير في استعمال أوزان فولية من طيب

R. 2 0.02 gm Bacteria → 1.00 gm food

الحثري

Amino acid													
	24	48	72	24	48	72	24	48	72	24	48	72	
L- Glutamic acid	0.0	0.0	0.0	10	30	76.6	3.3	30	90	10	40	76.6	
DL- Alanine	0.0	0.0	0.0	13.3	63.3	83.3	0.0	63.3	90	10	53.3	80	
L- leucine	0.0	0.0	0.0	6.6	70	86.6	3.3	50	83.3	3.3	58.3	90	
Folic acid	0.0	0.0	0.0	13.3	56.6	80	3.3	66.6	86.6	3.3	56.6	90	

Batch No 9

Date 18 12 94

Inoculum 3 1

Media 1200 ml

90800 ml

13.2 ml

58.2 ml

24 hrs Incubation

pH 7.2

Count

1.7 x 10⁸

1.7 x 10⁸

1.7 x 10⁸

1.7 x 10⁸

1.7 x 10⁸

1.7 x 10⁸

1.7 x 10⁸

1.7 x 10⁸

1.7 x 10⁸

1.7 x 10⁸

1.7 x 10⁸

1.7 x 10⁸

1.7 x 10⁸

1.7 x 10⁸

1.7 x 10⁸

1.7 x 10⁸

1.7 x 10⁸

1.7 x 10⁸

1.7 x 10⁸

1.7 x 10⁸

1.7 x 10⁸

1.7 x 10⁸

1.7 x 10⁸

1.7 x 10⁸

1.7 x 10⁸

1.7 x 10⁸

المعيار ١٠/١٠/١٠

نتائج تجارب طعم - دو توليفة طيب - لبيد - مع - لولا -

Viable Count 1×10^{10}

Bioassay نتائج

% Kill 48 hrs

% Kill 72 hrs

Control 3.3

3.3

1×10^8 36.6

63.3

1×10^9 58.6

80

نتائج طعم - دو توليفة طيب - لبيد - مع - لولا -

Viable Count 1×10^{11}

Bioassay نتائج

% Kill 48 hrs

% Kill 72 hrs

Control 0.0

0.0

1×10^8 2.0

46.6

1×10^9 7.0

96.6

Batch μ 10

Date 22-1-95

Inoculum 3 μ

Medium 1200 ml Whang

10800 ml D.W.

13.2 ml C.S. to I

56.2 ml C.S. to II

بصفتها لينة μ 7.6 μ BH

التي هي 6.5×10^8 = viable count

الموتى 1.18×10^8

viable count = 9×10^{11}

% Kill Bioassay نتائج

4.8 hrs 7.2 hrs

1×10^7 36.6 50

1×10^8 70 90

1×10^9 93.3 100

١٩٢٥ / ١ / ١٨

Brasserie

مختبر جبر الهندسة المعمارية

١٩٢٥ / ١ / ١٨

variable - cant 3 x 10¹¹

48 hr Kill %

Kill % 72 hr

1 x 10⁸ 36.6

8.6

1 x 10⁹ 76.6

9.6

N.C. 1 x 10¹¹

V.C. 1 x 10¹²

% Kill 48 hr

% Kill 72 hr

% Kill 48 hr

% Kill 72 hr

1 x 10⁸ 70 93-3

50 70

1 x 10⁹ 100 100

60 80

Date 18-6-95

Inoculum 30 %

Media 3.500 ml Whey

10500 ml P.W.

15.4 ml C.S.L I

65.65 ml C.S.L II

pH 7.9

3-1

laboratory samples of 50-55 g (dry wt) of encapsulated

B. thuringiensis were prepared in the following manner.

Refined corn oil (2g) is mixed with pregelatinized starch

powder (25g). Chilled (2°C) distilled water (60 ml) containing

suspension of B.t. spores and crystals at the

desired concentration is stirred into the starch-oil

mixture, forming a gelatinous mass within 10-15 s.

This mixture is allowed to stand for 30 min. at

room temperature, producing a rubbery, nonsticky mass

which is then processed in a waring blender with 25g

pearl starch powder to yield particles that pass a 14-

mesh screen (1.410 mm). After air drying for 24 hr.

at room temperature, the particles are sieved into various

mesh sieves. the resulting particles contain B.t. spores

and crystals that are entrapped within the pregelatinized

starch matrix surrounded by a thin coating of pearl

starch.

A. Ogami (1961)

(۴)۔ مہلے عالمی لمبرائے

حج. تكفوت. سئل المطاوعة عن التزج.

حیات و تنفس ۱۴

۱۳۔ میرے حقوق، بات، اصحاب، مختلفہ وقت، مناظر، لکھنؤ، بات، میری بات مختلفہ۔

در حمام

١٧- بحري عليه الاختيار لإصدار للمؤسسات العامة

B. t-kurs tak:

4-B-125

7.2 hw

30-151-96.

0.106 mm 1007 1007

0.250 mm. 100% 100%

0.560 mm 100% 100%

1.00 mm. 4.0 % 86.6%

~~1.00 mm 53.3% 93.3~~

5 to 2K 100% 100

Control 0.0%

B.t. - Kurstaki

4-8: W.D.

7.2 hrs.

2161-96

0.250 mm 1.00% 1.00%

0.560 mmi. 43 % 60 %

1.00 mm 20 % 26.6 %

~~2~~ 1.00 mm. ~~10~~ 7. ~~13.3~~ 1.

stock 3.6-6 1/2 5.0 1/2

Control 0.0%

أحيات التجريبية

	<u>4.8</u> <u>hrs</u>	<u>7.2</u> <u>hrs</u>	<u>B. t.</u> <u>K. w. stack.</u>
0.250 mm.	96.6 %	100 %	9/6/1996
0.5-6.0 mm.	16.6 %	36.6 %	1-1-10.0 1.1 x 10 ⁶
1.00 mm.	3.3 %	3.3 %	
1:00 mm	3.3 %	6.6 %	
stock	33.3 %	40 %	0.01-500 1.1 x 10 ⁶

Bacillus thuringiensis Kurstaki

Batch no. 1

Date 20/7/96

Inoculation 3/7

Media 3 liter Whang

9 liter D.W.

13.2 ml C.S.L I

5.6 ml C.S.L II

أنهت التجربة بعد ٤٥ ساعة. الرقم ٨.٩ = pH

و بعد ١٠٠ ساعة كانت البكتيريا

اصفراء اللون المستعينة

و بعد ١٠٠ ساعة

viable count : 3.3×10^{10} spore/gm.

Bacillus thuringiensis Murstaki

Batch No. 2

Date 12 / 8 / 96

Inoculation 3 %

Media: 3 liter Wbenz

9 liter D.W.

13.2 ml C.S. L I

56.2 ml C.S. L II

لحمية نباتية - ماء - pH = 7.5 ، النمو جيد ، متكاثره سموات دافئة

انتهت التجربة لحمية نباتية - ماء - pH = 7.9

معدة ترسيب - إنتاج - طعم - لونه - لونه - 163 gm

أصبحت الحبة البنية - 3 - 1

ديزات : 48.9 gm

- Viable Count : 3×10^{10} spore / gm

Batch No - 2 Batch No 1 النموذج لوحده

Viable Count : 2×10^{10} spore / gm

Bioassay :

48 hrs.

72 hrs

1×10^8

76.6 %

93.3 %

1×10^9

100 %

100 %

Control

0.0 %

0.0 %

Bacillus thuringiensis Kirstaferi

Batch No. 3

Date 9-11-96

Inoculation 3%

Media	3.500 ml	Whey
	10.500 ml	D.W.
	15.4 ml	C.S.L-I
	65.65 ml	C.S.L-II

8.7 = pH أصبح ليل سائ

والحق جيد مع تكاثر البورات داخلية مع عدم قتل البورات الخارجية

مع البنية بعد سائ

Batch No. 4

Date 16-11-96

7.6 = pH أصبح ليل سائ

الحق جيد مع تكاثر البورات داخلية وطفو جيد

Batch No. 5

Date 19-11-96

① Batch No. 5 + Batch No. 3

Viable Count: 1×10^{11}

Bioassay: 48 hr 72 hr

1×10^8 58% 60%

1×10^9 100% 100%


② Batch No. 4

Viable Count: 2×10^{10}

Bioassay: 48 hr 72 hr

1×10^8 100% 100%

1×10^9 100% 100%



المخزات البروتينيه

Single cell protein

"S.C.P."

تشیع کا تاریخ

تشیع کا تاریخ

" 9.2.6 "

١- تخمير العقب وخصه تحت هيد
نسبة البروتين الموجودة في العقب ٢.٥٪، يعتبر الوسط طرياً النمو لفترة
تكون نسبة اختلف من العقب إلى الوسط التري ١٪ من الوسط
الزرك العائلي
المحتوى كبر للعتب يتكون من مواد سليوزية وسكريات فضائفة (مقدرة)

٢- تخمير فلول (١٪ من ١- NaOH وذلك لتفيع العقب المالحون
وبعد ذلك يوضع المزيج في جيزل *Auto-clave* ثم يستعمل لحرارة
والصنف اعلى تتم عملية العلق العياد طادق للعتب وتكون كريات
الفضائفة والمواد السليوزية إلى كريات تناسية وأحادية
وهذا الطريقة آخر للعلق وهذا استعمال العلق الاتر في نمو ذلك بمعاملة العقب
باجتاحة اتر عيم لتسليط ليقوم بدوره في قلع المواد السليوزية إلى مواد بسيطة

٣- بعد ذلك يبرد المزيج ويوضع في جيزل تخم *Fermentor* ويعمل له
حاضنة H_2SO_4 لتزلي إلى pH إلى الحاضنة إلى 5.0 pH لعمو
الخيرة. وحب حرارة الوسط الملائمة لنمو الخميرة وهي ٢٠°م

٤- اضافة الامونيا كحيد نترجين لنمو الخميرة بسنة عيم / الت

٥- تخمير عائل من الخميرة *Candida utilis* بعد تنقية على *N. Broth*
لمدة ٤٤ ساعة وبلغ الوسط الزرك ٤٪ من هذا العائل
يتم تهيئة الخميرة مسبقاً وذلك بعد تنقية على أوساط لزعية (سلانت)
مكون من -

هذه طيب الال	20 g	كلوكوز
<i>Candida utilis</i>	10 g	بيتون
<i>S. cerevisia</i>	5 g	yeast extract
<i>N. Broth</i> أو	15 g	Agar
yeast extract	1 liter	D.W
8 g/liter		
2 g/liter		

تم تفصيل *Canthia ut* على *S. cerisea*
 في عملية إنتاج المركبات البروتينية وذلك بسبب احتوائها على نسبة
 عالية من الهامات الأخرى ((المسبوسات واللايسين))، لفائدة تربية
 المواشي *S. cerisea* محتوية بروتين بلان 0.575 - 3.515 - لايسين

بقيت *Canthia ut* محتوية بروتين بلان 0.298 - 1.872 - لايسين
 لكن بالرغم من ذلك مضينا مستمداً *Canthia ut* في هذه الفترة
 من التحسينات

توجد النتائج بعد الاستاذة وجمع وهي انه عملية تربية المواشي
 بعد ايراد المركبات ويحتمل ان يجمع ويحتمل نتائج موصوفة في
 القرن
 بعد ذلك توجد العادات وتقاسم جميع البروتينات الموجودة في
 صبي واصل نسبة البروتين الى 0.1

2) Batch No. 4

viable count : 1×10^{10}

Bisassay

	<u>48 hr</u>	<u>72 hr</u>
1×10^7	23.3 %	50 %
1×10^8	63.3 %	93.3 %
1×10^9	86.6 %	100 %

16 / 8 / 1998

B t. Kurstaki

R

Rough colony

Viabale Count : 1.9×10^{10}

0.25 gm $\Rightarrow$	50 gm (عربي)	1×10^8
1.25 gm $\Rightarrow$	25 gm (عربي)	1×10^9


S

Smooth Colony

Viabale Count : 1.6×10^9

1.5 gm $\Rightarrow$	25 gm (عربي)	1×10^8
----------------------	--------------	-----------------

	10^8 تركيز 48 hr. ع.	10^8 72 hr.	10^9 48 hr.	10^9 72 hr.
Rough Colony <u>R</u> :	90 %	100 %	95 %	100 %
Smooth Colony <u>S</u> :	Zero	5 %		
Control	Zero			



المخزات البروتينيه

Single cell protein

"S.C.P."

فینچ ہا شاخا

جنگل کا پرندہ

"J.C.D."

١- تخمير العقب وتخميره في هيدروكسيد الصوديوم $NaOH$ في الوسط
نسبة البروتين الموجودة في العقب $1/5$ ، يعتبر الوسط طاريئاً للموتجية
تكون نسبة الهبات من العقب إلى الوسط $1/1$ ، الوسط الزرّي
الزرك العائلي
المحتوى السكر للعقب يتكون من مواد سكرية وسكريات مضاعفة (مقدرة)

٢- تخمير فلول $1/1$ من $NaOH$ وذلك لتفريق العقب المالحون
وبعد ذلك يوضع المزيج في حيز $Auto\ Clave$ تحت ضغط حرارة
والضغط لكي تتم عملية القلي الكيميائي لمادة العقب وقول السكريات
المضاعفة والمواد السكرية إلى سكريات بنائية وأحادية
وهذه الطريقة أكثر للقلل وهو استعمال القلي المتتابع وذلك بمعاملة العقب
بمضاعفة التخمير لسليبيز ليقوم بدوره في قلي المواد السكرية إلى مواد بسيطة

٣- بعد ذلك يبرد المزيج ويوضع في حيز تخمير $Fermentor$ ويضاف له
حامض H_2SO_4 لتزيلي pH إلى الحامض $pH 5.0$ ليعود
الخمرة، وحب حرارة الوسط ملائمة لمتوسط الخميرة وهي $30^\circ C$

٤- إضافة الأمونيا في هيدروكسيد الصوديوم الخميرة بنسبة 2 غم / لتر

٥- تخمير عائل من الخميرة $Candida utilis$ بعد تنشيطه على $N. Broth$
لمدة 24 ساعة ويطبخ الوسط الزركي $1/4$ من هذا العائل
يتم تنشيط الخميرة مسبقاً وذلك بعد تنشيطه على أوساط لزنية (سلانت)
مكون من

هذه الجيلاتين	20 g	كلوكوز
<i>Candida utilis</i>	10 g	بيتون
<i>S. cerevisia</i>	5 g	Yeast extract
$N. Broth$ أو	15 g	Agar
Yeast extract	1 liter	D.W
8 gm/liter		2 gm/liter

تم تقطيل *Candida utilis* على *S. cerevisiae*

في عملية انتاج المركبات البروتينية وذلك بسبب احتوائها على نسبة عالية من الهامهة الاقية ((المستونج واللايسين))، المعتمدة في تربيتها

لواحيته *S. cerevisiae* محتوية بروتين على 0.575 - 0.575

لايسين 3.515

بقيت *Candida utilis* محتوية بروتين على 0.298 - 0.298

لايسين 1.872

لكن بالرغم من ذلك ففضلنا استخدام *C. utilis* في هذه التجربة

من المختبرات

توجد النتائج بعد ٤٠ ساعة وجمع وعلل له عملية تربيتها بواسطة

جدار المراد المركز ويحفظ أو يجمع ويحفظ مباشرة بواسطة في

الوقت

بعد ذلك توجد النتائج وتقاس نسبة البروتين الموجود في

حيث وصلت نسبة البروتين الى ١٠٪

ALPHA PLUS DATA SHEET

LKB 4151 Alpha plus Amino Acid Analyzer

Amino Acid	Amount n Moles	M.W	MW 1000 = K	mg/gm
Aspartic Acid	7.223	133.10		3.845
Threonine	4.117	119.12		1.961
Serine	5.489	105.09		2.307
Glutamic acid	8.208	147.13		4.830
proline	17.800	115.14		8.197
Glycine	5.820	75.07		1.687
Alanine	5.254	89.09		1.872
Cystine	0.195	240.30		0.187
Valine	3.351	117.15		1.570
Methionine	0.964	149.21		0.575
Isoleucine	2.171	131.18		1.139
Leucine	3.648	131.18		1.914
Tyrosine	1.722	181.19		1.248
phenylalanine	1.086	165.19		0.717
Histidine	2.127	155.16		1.320
Lysine	4.812	182.65		3.515
Ammonia	6.179			
Arginine	3.140	174.20		2.187

Sample : 1 (Saccharomyces cerevisia) Weight : 50 mg

Total Sample volume : 10 ml Volume Loaded : 50 μ

Prog NO : 1 A date : 16-10-91

Calculated by : Hajid Saadi Salman Run Number : 1

[illegible]

ALPHA PLUS DATA SHEET

LKB 4151 Alpha plus Amino Acid Analyzer

Amino Acid	Amount n Moles	M.W.	MW 1000	mg 1gm
Aspartic acid	4.708	133.10		2.506
Threonine	3.654	119.12		1.741
Serine	4.214	105.09		1.771
Glutamic acid	6.328	147.13		3.671
Proline	18.801	115.14		8.658
Glycine	4.221	75.07		1.216
Alanine	4.359	89.09		1.553
Cystine	0.198	240.30		0.190
Valine	2.159	117.15		1.011
Methionine	0.500	149.21		0.298
Isoleucine	2.058	131.18		1.079
Leucine	3.265	131.18		1.713
Tyrosine	1.412	181.19		1.023
phenylalanine	1.598	165.19		1.055
Histidine	0.919	155.16		0.570
Lysine	2.563	182.65		1.872
Ammonia	4.275			
Arginine	1.392	174.20		0.969

Sample : 2 (Candida utilis)

Weight 50 mg

Total Samples Volume : 10 ml

Volume Loaded : 50 μ

Prog no : 1 A

date : 16 - 10 - 91

Calculated by : Hajid Saadi Salman

Run Number: 2

yeast extract	4.5	gm	} - the for slants
glucose	10	gm	
peptone	7.5	gm	
Agar	20	gm	
D.W.	1	liter	

yeast extract	5	gm	} for the cultures
glucose	20	gm	
peptone	10	gm	

الوصفة	تاريخ ادخال الوصفة	الوزن كغم /	النشا	نسبة البروتين %	للملاحظات
الوصفة الاولى	١٩٩٩/٣/١٥	٧,٥	بدون نشا	١٨,٥ كغم	وزن مسحوق اللؤلؤ = ١/١ نسبة نشا = ١/١
الوصفة الثانية	١٩٩٩/٣/١٥	٦	بدون نشا	١٤,٨	وزن مسحوق اللؤلؤ = ١/١ نسبة نشا = ١/١
الوصفة الثالثة	١٩٩٩/٣/١٥	٦	بدون نشا		وزن مسحوق اللؤلؤ = ١/١ نسبة نشا = ١/١
الوصفة الرابعة	١٩٩٩/٣/١٥	٦	بدون نشا		وزن مسحوق اللؤلؤ = ١/١ نسبة نشا = ١/١
الوصفة الخامسة	١٩٩٩/٣/١٥	٦	بدون نشا		وزن مسحوق اللؤلؤ = ١/١ نسبة نشا = ١/١
الوصفة السادسة	١٩٩٩/٣/١٥	٩	اصافه نشا	٨,٥ كغم	وزن مسحوق اللؤلؤ = ١/١ نسبة نشا = ١/١
الوصفة السابعة	١٩٩٩/٣/١٥	٧,٥	اصافه نشا	١١,٥ كغم	وزن مسحوق اللؤلؤ = ١/١ نسبة نشا = ١/١
الوصفة الثامنة	١٩٩٩/٣/١٥	٧,٥	اصافه نشا	١١,٥ كغم	وزن مسحوق اللؤلؤ = ١/١ نسبة نشا = ١/١
الوصفة التاسعة	١٩٩٩/٣/١٥	٧,٥	اصافه نشا	٧,٤٦ كغم	وزن مسحوق اللؤلؤ = ١/١ نسبة نشا = ١/١
الوصفة العاشرة	١٩٩٩/٣/١٥	٧,٥	بدون نشا		وزن مسحوق اللؤلؤ = ١/١ نسبة نشا = ١/١
الوصفة الحادية عشرة	١٩٩٩/٣/١٥	٧,٥	بدون نشا		وزن مسحوق اللؤلؤ = ١/١ نسبة نشا = ١/١
الوصفة الثانية عشرة	١٩٩٩/٣/١٥	٧,٥	بدون نشا		وزن مسحوق اللؤلؤ = ١/١ نسبة نشا = ١/١
الوصفة الثالثة عشرة	١٩٩٩/٣/١٥	٧,٥	بدون نشا		وزن مسحوق اللؤلؤ = ١/١ نسبة نشا = ١/١
الوصفة الرابعة عشرة	١٩٩٩/٣/١٥	٧,٥	بدون نشا		وزن مسحوق اللؤلؤ = ١/١ نسبة نشا = ١/١

« مشروع تجميع المركبات البروتينية »

1- تجزئة رقم « 1 »

كواح الذرة بالمحوسبة ٢٠٠٥ كغم « (١/١) »

مولا س ٢٥٠ مل « (١/١) »

موريس ٥٠ غم « (١/١) »

ماد ٢٥ لتر

لصاق الحيرة (١ لتر) « (١/١) »

تم التوقيع بتاريخ ١٩٩٩/١٢/٢٢

2- تجزئة رقم « 2 »

ماد ٢٥ لتر

كواح الذرة ٢٠٠٥ كغم « (١/١) »

مولا س ٣٦٥ مل « (١/١) »

لصاق الحيرة ١ لتر « (١/١) »

تم تحصيل المبلغ بعد « ١٠٠٠٠٠ » و لو فاضل « ١٠٠٠٠٠ »

تم قيام « ١٠٠٠٠٠ » و كانت طاعة « ١٠٠٠٠٠ »

R₁ 9.19 }
R₂ 8.46 } خالد خليل

R₁ 11.158 }
R₂ 11.375 } خالد خليل

وزن المادة المملحة في ١٠٠ غم من طولا « ١٠٠٠٠٠ »

وزن طولا « (X) » من المواد المملحة « ١٠٠٠٠٠ »

مواد مملحة }
١٠٠٠٠٠ }
X }
١٠٠٠٠٠ }

١٠٠٠٠٠ مواد مملحة 3.22 1 0.31 X

نمبر الحرفی کے حوالہ سے : ۱۳۰۳۸ = ۵۔ P=

وعدة مقارئة مقارئة D مع الحركات

(2) - كبرياء

لے

لغز

ملے - (۲۰٪)

De N

تفسیر

« قلیل »

Id. 5

تسعة - البرونز

عن - من المقررة - وقت طالع

2

17.

21

—y

1

1

2-1-2

— 2 —

2

16

الحمد لله

۲۰

..

4

م

2

—

وہ

گیت

— — —

يومياً

ع

Amino Acid

Structure (R-group)

1	Aspartic (Asp)	CH_2COOH
2	Threonine (Thr)	$\begin{array}{c} \text{CH} - \text{OH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$
3	Serine (Ser)	$\text{CH}_2 - \text{OH}$
4	Glutamic (Glu)	$\text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$
5	Proline (Pro)	
6	Glycine (Gly)	H
7	Alanine (Ala)	CH_3
8	Cysteine (Cys)	$\text{CH}_2 - \text{SH}$
9	Valine (Val)	$\text{CH} - (\text{CH}_3)_2$
10	Methionine (Met)	$\text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{S} - \text{CH}_3$
11	Isoleucine (Ile)	$\begin{array}{c} \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$
12	Leucine (Leu)	$\text{CH}_2 - \text{CH} - (\text{CH}_3)_2$
13	Tyrosine (Tyr)	$\text{CH}_2 - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{OH}$
14	Phenylalanine (Phe)	$\text{CH}_2 - \text{C}_6\text{H}_5$
15	Histidine (His)	$\text{CH}_2 - \text{Imidazole}$
16	Lysine (Lys)	$\text{CH}_2 - (\text{CH}_2)_4 - \text{NH}_2$
17	Ammonia	
18	Arginine (Arg)	$\text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{NH} - \text{C}(=\text{NH}) - \text{NH}_2$

Single Cell protein

M.S. Media for yeast

		1 liter	500 ml	250 ml	100 ml
1	KH_2PO_4	5.0 g	2.5 g	1.25 g	0.5 g
2	$(NH_4)_2SO_4$	3.0 g	1.5 g	0.75 g	0.3 g
3	$MgSO_4$	5.5 g	2.75 g	1.375 g	0.55 g
4	KCl	0.1 g	0.05 g	0.025 g	0.01 g
5	$CaCl_2$	0.1 g	0.05 g	0.025 g	0.01 g
6	$NaCl$	5.0 g	2.5 g	1.25 g	0.5 g
7	Yeast extract أو خبث بيرة المضاف إلى الماء	2.0 g	1.0 g	0.5 g	0.2 g
8	Ethanol or Methanol	5 ml	2.5 ml	1.25 ml	0.5 ml
9	D.W	1 liter	500 ml	250 ml	100 ml
	pH = 5.5				

30-8-1995

((Sub, exp))

Batch no.	Viable Count
R 11	0.9 $\times 10^{11}$
R 12	0.2 $\times 10^{11}$
R 13	0.26 $\times 10^{11}$
R 14	0.03 $\times 10^{11}$
R 15	2.1 $\times 10^{11}$
R 16	0.9 $\times 10^{11}$
R 17	1.7 $\times 10^{11}$
R 18	1 $\times 10^{11}$
R 108	4.6 $\times 10^{11}$
R 109	3.2 $\times 10^{11}$
R 110	1.4 $\times 10^{11}$
R 111	0.8 $\times 10^{11}$

Bio assay

	Kill % 48 hrs.	Kill % 72 hrs.
R 15		
1 $\times 10^8$	20	26.6
1 $\times 10^9$	30	46.6
R 108		
1 $\times 10^8$	6.6	6.6
1 $\times 10^9$	6.6	6.6
Control	0.0	0.0

Variable Count

<u>Run</u>	68	2.6	$\times 10^9$
	69	5.1	$\times 10^9$
	70	1.3	$\times 10^{10}$
	71	2.2	$\times 10^9$
	72	2.6	$\times 10^9$

Run	V.C	Ex. V.	Kill % 48 hr.	Kill % 72 hr.	Control %
73	2×10^{10}	1×10^7	70	100	6.6
		1×10^8	83.3	96.6	
		1×10^9	50	100	
74	1.2×10^{10}	1×10^7	30	46.6	
		1×10^8	93.3	100	
		1×10^9	96.6	100	
76	2×10^{10}	1×10^7	83.3	100	
		1×10^8	93.3	100	
		1×10^9	90	100	
77	2×10^{10}	1×10^7	83.3	100	
		1×10^8	93.3	100	
		1×10^9	76.6	100	
78	2.7×10^{10}	1×10^7	210	53.3	
		1×10^8	96.6	100	
		1×10^9	96.6	100	
79	1.2×10^{11}	1×10^7	33.3	36.6	
		1×10^8	40	76.6	
		1×10^9	96.6	100	

ملاحظات

⑤ نیت استقلال پروردگار عزوجل ۱۵۴

(ج) اخراج المروحة لعب الاشارة من تحت البوق

فتح الله عليه تسليماً له على ما كان عليه من الجور والظلم

فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ لَا يُفْعَلُ فِيهِ رَدٌّ وَلَا يُجِيرُ

تتبع متابعه سطور دهنه لـ «*Vacuum*» في الميز

(۱) عیب از تلوین الحان و محمده نسل حبیبش رصفه گئی لکارا

Free2 drying

مزینة عمل خیر

مکھنر لموزج

Saline مزلت مرآت بعد
Centrifuge تر سبیه آ

چ یخاف له ۱ مل من ۱۰۰ علیج مزوج پر هکته ((حلیج مزینا))
Skim milk قی قایلانے خاصه بالکیر در قایلانے ذات
سار طاهر

over night deep freeze مزینة

مزینة عمل خیر

مستقبل خیر عمل وضع

Freeze متل وضع لموزج ولده مساعین ملان لاقول

مقده لمناذج علی طرف الخیر

over night freeze مزلت لکیر وضع

ملاط تلوت قمر حیات داخل القابل در عمل لموزج بالکیر مزینا

Secondary freeze ولده مساعین

واحد لیسب الرطوبه منا لموزج

Out late مزلت لکیر وضع
مبارک لکیر مزلت لکیر

$$X = \frac{1 \times 10^9}{0.3 \times 10^{12}} = \frac{1}{300} = 0.003 \text{ gm}$$

$$0.003 \times 200 = 0.6 \text{ gm} \rightarrow 1 \times 10^9$$

«مسحوق سميدان ليتريا» مديد (درجيش).

السنة ١٩٩٠/٧/٤

نتائج تجريبية خنثية لحيوانات اليوم الثالث من اخصاب ١٩٩٠/٦/٢٠
تأثير مسحوق سميدان ليتريا الناتج من ١٩٩٠/٦/٢٠ على الحشرات
وسيتكون 1×10^9 طائفة طالفة

نسبة لقتل

$$\text{Control} = 6\%$$

$$1 \times 10^9 = 10.0\%$$

الحمية ١٥٠ - ١٦ - ١٩٩٢

نتائج تجربة الحشرات لبيبا ١٥٠ - ١٦ - ١٩٩٢

وطانة النتائج طالاف

Control	10%	نسبة قتل
10^7	63.3%	
10^8	93.3%	
10^9	100.0%	

نتائج تجربة مختبر طالاف لبيبا ١٥٠ - ١٦ - ١٩٩٢

وطانة النتائج طالاف

2 gm pent + 200 gm media	1×10^8	6%
20 gm pent + 200 gm media	1×10^9	16%
200 gm pent + 200 gm media	1×10^{10}	66.6%
Control	3.3%	

الاشعة ١٥٠ - ١٦ - ١٩٩٢

عملنا ال viable count للتبعا الحية جيب من لعل [R3]

للتخافيف 10^{-10} , 10^{-9}

النسار ١٥٠ - ١٦ - ١٩٩٢

نتيجة ال viable count للتخافيف 10^{-9}

33 , 34 , 35 = 34

$$34 \times 10^9 \times 10 = 34 \times 10^{10} = 0.3 \times 10^{12}$$

$$\left. \begin{array}{l} 0.3 \times 10^{12} \\ 1 \times 10^9 \end{array} \right\} \begin{array}{l} 1 \\ \times \end{array}$$

$$\frac{0.5 \times 10^{10}}{1 \times 10^9} = 5$$

الانتزاع

$$\frac{1 \times 10^9}{0.5 \times 10^{10}} = \frac{1}{5} = 0.2 \rightarrow 1 \times 10^9$$

$$0.2 \times 200 = 40 \text{ gm powder} + 200 \text{ gm media} \rightarrow 1 \times 10^9$$

$$4 \text{ gm powder} + 200 \text{ gm media} \rightarrow 1 \times 10^8$$

$$0.4 \text{ gm powder} + 200 \text{ gm media} \rightarrow 1 \times 10^7$$

١٩٩٤ / ٦ / ٢٤

قام مختبر الحشرات بالبحرانية التالية بتلويح ١٩٩٤ / ٦ / ٢٤

تأثير تركيز البترنايت على نسبة الحشرة بوجود اضافة القناري (الجرش)

(البترنايت)

(الجرش)

ملاحظات

$$1 \text{ gm Pent.} + 100 \text{ gm media} \rightarrow 1 \times 10^8$$

$$2 \text{ gm Pent.} + 200 \text{ gm media} \rightarrow 1 \times 10^9$$

$$1 \text{ gm Pent.} + 10 \text{ gm media} \rightarrow 1 \times 10^8$$

$$20 \text{ gm Pent.} + 200 \text{ gm media} \rightarrow 1 \times 10^{10}$$

$$1 \text{ gm Pent.} + 1 \text{ gm media} \rightarrow 1 \times 10^8$$

$$200 \text{ gm} \rightarrow 200 \text{ gm}$$

المراقبة الثانية

$$\left. \begin{array}{l} 1 \times 10^{10} \\ 1 \times 10^9 \end{array} \right\} \begin{array}{l} 0.5 \text{ gm} \\ x \end{array}$$

$$x = \frac{10^9 \times 0.5}{1 \times 10^{10}} = 0.05 \text{ gm}$$

$$\begin{array}{l} 0.05 \text{ gm powder} + 1 \text{ gm media} \rightarrow 1 \times 10^9 \\ 1.0 \text{ gm powder} + 200 \text{ gm media} \rightarrow 1 \times 10^9 \\ 1 \text{ gm powder} + 200 \text{ gm media} \rightarrow 1 \times 10^8 \\ 0.1 \text{ gm powder} + 200 \text{ gm media} \rightarrow 1 \times 10^7 \end{array}$$

المراقبة الثالثة - viable count - المراقبة الثالثة

$$10^{-7} \quad 36 \quad 37 \quad 42 \quad = \quad 38$$

$$10^{-8} \quad 5 \quad 8 \quad 4 \quad = \quad 5.6$$

$$1) \quad 38 \times 10^7 \times 10 = 3.8 \times 10^9 \text{ cell/ml (0.1 gm)}$$

$$3.8 \times 10^9 \times 10 = 3.8 \times 10^{10} \text{ cell/gm}$$

$$2) \quad 5.6 \times 10^8 \times 10 = 5.6 \times 10^9 \text{ cell/ml (0.1 gm)}$$

$$5.6 \times 10^9 \times 10 = 5.6 \times 10^{10} \text{ cell/gm}$$

مقدار الفيدل

$$4 \times 10^{10}$$

$$4.7 \times 10^{10}$$

$$0.5 \times 10^{10}$$

$$\left. \begin{array}{l} 4 \times 10^{10} \\ 1 \times 10^9 \end{array} \right\} \begin{array}{l} 1 \text{ gm} \\ x \end{array}$$

$$x = \frac{1 \times 10^9}{4 \times 10^{10}} = \frac{1}{40} = 0.02 \text{ gm}$$

حساب *Bacillus thuringiensis* الكثرية الـ *Viable Count*

يؤخذ العنق من الميكروب بعد سحبه بعلقة المعلقة ويضاف الى ٩.٠ مل من الماء المقطر المعقم ويترك جيداً وبعد ذلك يوضع في الـ *Water Bath* في درجة ٣٨°م لمدة ١٠ دقائق وذلك لتفكيك التكتلات الموجودة بالميكروب الآخرى وذلك لتسهيل حسابات *Bacillus* على الآلات وبعد ذلك تعلق التمامية وذلك بإضافة ١.٠ مل من المعلق الاول الى ٩.٠ مل من الماء المقطر المعقم ومن ثم يفرس ١.٠ مل من المعلق على طبق الـ *Nutrient agar* وتترك في حاضنة ٣٨°م لمدة ٢٤ ساعة في اليوم التالي يبين عند المخرجات الكثرية والحالات

١٠	١	٣	٢	٣	٢.٦	(١.٠ - ٥.١ ml)
١٠	١	٣٤	٢٥	١٩	٢.٤	
١٠	١	٣	٢	٣	٢.٦	Cell / ml (٥.١ gm)
١٠	١	٣٤	٢٥	١٩	٢.٤	Cell / gm

١) ٢.٦	$\times 10^8$	$\times 10$	=	٢.٦	$\times 10^9$	Cell / ml (٥.١ gm)
٢.٦	$\times 10^9$	$\times 10$	=	٢.٦	$\times 10^{10}$	Cell / gm
٢) ٢.٤	$\times 10^7$	$\times 10$	=	٢.٤	$\times 10^9$	Cell / ml (٥.١ gm)
٢.٤	$\times 10^9$	$\times 10$	=	٢.٤	$\times 10^{10}$	Cell / gm

٢.٥	$\times 10^{10}$	Cell / gm
٢	$\times 10^{10}$	
١ gm powder + ١.٠ gm media	$\rightarrow$	2×10^9
٥.٥ gm powder + ١.٥ gm media	$\rightarrow$	1×10^9
$\times 2.0$		
١.٥ gm powder + ٢.٥ gm media	$\rightarrow$	1×10^9
١ gm powder + ٢.٥ gm media	$\rightarrow$	1×10^8
٥.١ gm powder + ٢.٥ gm media	$\rightarrow$	1×10^7

Electrical conductivity

نوت: ١ - غم في لترية المراد قياس درجة ملوحة في
 ليتر وتخرج مع طار القدر إلى أن تصبح ليته وبتاستكة
 وبعد ذلك نعلق قطة ليتر بورق السيلوفان ويرك لمدة
 ٤ ساعات ومن ثم يرشح في حرك الترشيح *Filtration*
 وقياس برشح في حرك ترقياس للوحة


حساب مقدار الخلية Total Count

حساب Total Count الخلية بكتيرية من قوع
 قحرة من الخلية على (Haemocytometer) ويسمى
 الحرة قحرة الخلية وتكون ليته باستفاد الخلية في طريق واحد
 وثاني

المربع الكبير عدد ليترية 1×10^{-4}
 المربع الوسطي عدد ليترية 1×10^{-5}
 المربع الصغير عدد ليترية 1×10^{-6}

حساب القدرة الحية Viable Count

تعمل تخافق القدرة للخلافة الليرة وذلك بإضافة ١ مل من
 الخلافة إلى ٩ مل من طار قطر لعقم حيث يكون الناتج نصف ١٥
 وبعد ذلك يوم من هذا النصف ١ مل إلى ٩ مل من طار قطر لعقم
 فنكون النصف ١٥^٢ وهكذا وبعد ذلك يؤخذ ١ مل من النصف
 المتبقي إلى Viable Count إلى حيث من *Nutrient agar* ويترك
 ليحلب *Spreading* وليته ٤ ساعات في خافق ٢٨^٢ وبعد ذلك
 في عدد لقرات الناتجة
 عدد لقرات 1×10^6 معكوس ليته في العدد الحي للليترية
 (cell per ml)



كمية استهلاك الحيز الـ sp لم يـ OD

توضع في المراحل التالية

Go to $\rightarrow$ 540 $\rightarrow$ Enter $\rightarrow$ Mode $\rightarrow$ 4

«الطول الموجي»

Enter $\leftarrow$ ABS 0 $\leftarrow$ بفتح لنودج $\leftarrow$ Enter

100% T (Control)

«لتقريب الحيز»

Start $\rightarrow$ وبعد ذلك توضع لتأخذ لراد

عـ الـ OD على لتقابل القراءة

Microbial Control of pests and
plant Diseases

1970 - 1980

edited by H.D. Burges

الفرق الجاف للـ CS_2 المرحلة II

7.235 / 1000

[illegible]

المجمع التسويقي لمنتجتي
منظمة الطاقة الذرية

«بطاقة استلام مواد»

7

№ 03061 : ١ - التسلسل

٢- الاسم الكامل: عبدنات هنون عباس

۷۰۰ : ۵۰۰ : ۲۰۰

٧٠٩ : القس - ٣

ختم و توقیع المجمع

توقیع المنسوب

[illegible]